

# **Brugsanvisning til mindre anvendelse af Pirimor 500 WG (396-78)/LFS Pirimicarb (318-81) mod bladlus i agurk, drueagurk, courgette, melon, peberfrugt, tomat, aubergine, pepino, salat, rucola og krydderurter i åbne væksthuse**

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

## **Ansvar for mindre anvendelse og vejledning**

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

### *Vejledning til mindre anvendelse - eget ansvar*

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til mindre anvendelse følges. HortiAdvice kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle arter og sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

# Vejledning for Pirimor 500 WG (396-78)/LFS Pirimicarb (318-81) mod bladlus i agurk, drueagurk, courgette, melon, peberfrugt, tomat, aubergine, pepino, salat, rucola og krydderurter i åbne væksthuse

## Skadedyrsmiddel:

- Må kun anvendes til bekæmpelse af bladlus i agurk, drueagurk, courgette, melon, peberfrugt, tomat, aubergine, pepino, salat, rucola og krydderurter i åbne væksthuse
- Brugsanvisningens angivelser skal overholdes
- Må i salat, rucola og krydderurter ikke anvendes senere end 7 dage før høst
- Må i agurk, drueagurk, courgette, melon, peberfrugt, tomat, aubergine og pepino ikke anvendes senere end 3 dage før høst
- Sprøjtefører skal anvende kemisk bestandige handsker og beskyttelsesdragt ved blanding, påfyldning og udbringning
- For at beskytte grundvandet må der på samme areal højst anvendes de i brugsanvisningen angivne maksimale doseringer pr. år. Max 1 behandling i alt pr. areal pr. år. Der må ikke i samme vækstår anvendes andre midler med pirimicarb på samme areal
- Ved anvendelse i krydderurter dyrket i potter på jorden uden recirkulering: Potterne skal stå helt tæt (pottetæt kultur)

## Advarsel:

”Se Pirimor 500 WG/LFS Pirimicarb etiketten”.

## Brugsanvisning

Anvendelse: Mod bladlus i åbne væksthuse.

| Afgrøde   | Max dosering pr. behandling  | Antal behandlinger pr. kultur | Antal behandlede hold pr. væksthuseareal pr. vækstår | Sprøjtefrist |
|---|--|-------------------------------|--|--------------|
| Agurk, drueagurk, courgette, melon, peberfrugt, tomat, aubergine og pepino  | 0,30 kg/ha<br><u>Svarende til:</u><br>Max. 100 liter 0,03 % opløsning pr. 1000 m <sup>2</sup> (= 0,30 kg Pirimor 500 WG / LFS Pirimicarb pr. ha) | 1                             | 1  | 3 dage       |
| Krydderurter dyrket i potter på tætte borde med recirkulation, eller dyrket i potter på jorden i pottetæt kultur. | 0,30 kg/ha<br><u>Svarende til:</u><br>Max. 100 liter 0,03 % opløsning pr. 1000 m <sup>2</sup> (= 0,30 kg Pirimor 500 WG / LFS Pirimicarb pr. ha) | 1                             | 1  | 7 dage       |

|  |  |   |   |        |
|--|--|---|---|--------|
| Salat og rucola<br>dyrket i jorden<br>(BBCH $\geq$ 20) | 0,30 kg/ha<br><br><u>Svarende til:</u><br>Max. 100 liter 0,03 % opløsning pr. 1000 m <sup>2</sup> (= 0,30 kg Pirimor 500 WG / LFS Pirimicarb pr. ha) | 1 | 1 | 7 dage |
|--|--|---|---|--------|

\*0,03 % opløsning (= 30 g Pirimor 500 WG/LFS Pirimicarb i 100 L vand)

*Sprøjteteknik:*

Sprøjter med horisontal eller vertikal sprøjtebom samt sprøjter med lanse.

*Sprøjtetidspunkt:*

Der behandles ved behov iht. Brugsanvisningen.

*Risiko for skade:*

Ved anvendelse af Pirimor 500 WG/LFS Pirimicarb i nye afgrøder eller sorter, bør det afprøves på et mindre antal planter først. Hermed fås erfaring med midlet og risikoen for skader reduceres.

18. august 2021