

Økologiske frø til økologiske gulerødder

DanRoots

Sådato: 23.05.2024

Gps: 56.52311, 9.80730

Fire rækker af hver sort. Ca. 50 m lange parceller.

Spiretest af frø i laboratorium inden såning.

	Spireenergi, % spirede efter 7 dage	Spireevne, % spirede efter 14 dage
Naval	74	76
Nipomo	74	78
Amiva	75	80
natuna	79	81
Norway	78	81
KS-MOG-CHE-FY	76	83
Negovia	82	84
Napoli	74	86
treenetaler	82	86
Romance	80	86
Vitella	80	89
Brillyance	88	91
Allyance	89	92
Bollin	88	94
SAT46	87	94



Sort	Plantetal, pl/m rk	Mark- spiring, %
Brilliance	123	100
Vitella	120	98

SAT46	108	88
Bollin	104	85
Negovia	112	83
Octavo	99	81
Napoli	107	80
Allyance	97	79
Amiva	102	76
Treenetaler	101	75
Natuna	110	75
KS-MOG-CHE-FY	109	74
Maistro	103	70
Norway	93	69
Naval	99	67
Speedo	83	61
Nipomo	87	59
Romance	67	50

Såmaskinen var indstillet til at give 120 frø/m rk. For sorter med lidt lavere spireevne er der sået yderligere 10 frø/m rk (Negovia, Napoli, Amiva, Treenetaler, Norway, Speedo, Romance). For sorter med lavest spireevne er der sået yderligere 20 frø/m rk (Natuna, Ks-Mog-Che-Fy, Maestro, Naval, Nipomo). Den beregnede markspiring er beregnet individuelt for hver sort ude fra den skønnede udsædsmængde. Der kan dog være nogen usikkerhed fordi frøstørrelsen ikke er ens og afskrabere på såmaskinen bør kalibreres for hver enkelt sort.

lrm

Senest opdateret 05.06.2024

Produktionsafgiftsfonden
for frugt og gartneriprodukter