

GrønsagsNYT

Nr. 5 // 8. april 2022



Omskifteligt vejr i tiden, bl.a. med hagl

Aktuelt	1
Regler og lovstof	3
Nyt om kemi	4
Nyt om kulturerne	4
Salat og kål	4
Løg	6
Porre	8
Gulerødder	8
Pastinak, Persillerod og Rødbede ...	9
Asparges	9
Plukærter	10
Projekter	10
Øget fosforudnyttelse i grønsager	10
Arrangementer 2022	11

Aktuelt

Så har vi overstået marts måned 2022, som har fået rekorder både for den tørreste og mest solrige i mange år.

Og så fik vi vand! Det var tiltrængt mange steder, og hjælp i stor stil både overfor sandflugt, på spiring og på plantning. Denne uge har vist meget omskifteligt vejr, bl.a. med regn, hagl og solskin skiftevis. Det ser ud til, at der nu trænger lunere luft ind over landet, og påskeugen kan byde på tocifrede temperaturer og måske kan vi endda vinke farvel til nattefrosten. Og fortsat perioder med omskifteligt vejr med en del skyer og regn.

Jordtemperaturen

Jordtemperaturen har haft et lille sving op, nogle steder helt over 10 °C, nu ligger den igen omkring de 5 °C, men prognosen viser tydeligt at den er på vej opad mod 8 °C i de kommende dage.

Jordtemperaturen kan følges her: [Tjek jordtemperaturen i dit lokalområde \(landbrugsinfo.dk\)](https://landbrugsinfo.dk). Vælg din by og se aktuell jordtemperatur og prognosen for de kommende dage.

Risiko for næringsstofmangel

Da jordtemperaturen, som nævnt ovenfor fortsat lav, flere steder $< 5^{\circ}\text{C}$, giver det generelt langsom spiring og vækst og sænker tilgængeligheden af kvælstof og fosfor til et minimum.

Derudover skal man være obs på bor- og manganmangel. De tørre forhold vi har haft i marts, kan fremprovokere bormangel, især på sandjorde, hvor udvaskningen er størst. Det er derfor en god ide at følge op med analyser i sæsonen, både mangan og bor kan give udfordringer.

Vildtafskrækning fra fiberdugen

Det er højsæson for ødelæggelser på fiberdug og plastik efter både fugle og hjortevildt. Og det er så ærgerligt!

Der findes forskellige metoder til at afskrække både fugle og hjortevildt i problemmarkerne.

- Vildthejn
 - Fungerer godt, men er omkostningstungt at købe, sætte op og flytte
- Fugleskræmmere
 - Fugle "på pind", se eksempel på billedet
 - Elektroniske fugleskræmmere, der udsender lyde til at skræmme fugle og vildt væk
- Agrocover eller lignende
 - er effektivt og forhindrer også fiberdugen i at flyve væk. Reducerer lysindstrålingen noget og er bestemt ikke gratis, men holder længe.
- Trico
 - Er godkendt til afskrækning. Midlet er baseret på fårefedt. Ifølge etiketten skulle dette afskrækningsmiddel virke vha. duft og smag og skulle have virkning i op til 14 dage. Følg [vejledningen](#).
- Aminosol
 - Gødningen Aminosol har en sideeffekt ved koncentreret anvendelse på afskrækning af vildt.
 - For at undgå vildt i marken og ødelæggelse af fiberdugen kan følgende kur bruges:
 - 2 l Aminosol® blandes med 2 l vand og står i 3 dage inden sprøjtevæsken bruges.
 - Når blandingen har stået i 3 dage og lugter fælt:
 - Dyp nogle klude i blandingen og fordel disse rundt om de berørte marker, på nogle hegnspæle eller lignende.



Indvirkninger af krigen i Ukraine

Den forfærdelige krig i Ukraine vil have indvirkninger på mange ting i det danske landbrug og gartneri.

Gennem de sidste måneder har vi set voldsomme stigninger på gødnings- og gaspriser. Og det er uvist hvordan tilgængeligheden bliver for både gødning og gas.

Derudover kan det have væsentlige indvirkninger på udbuddet af arbejdskraft, men det er vanskelig at spå om hvilken. Mange ukrainere arbejder normalt i polske og tyske gartneribedrifter, i år kan mændene ikke komme, men til gengæld er der mange flygtninge. Om det i praksis bliver muligt for flygtningene at arbejde er usikkert, særligt da mange har børn og unge mennesker med herop, der måske skal passes derhjemme. Velas, men sikkert også andre, har taget initiativer til at formidle hjælp og arbejde, læs mere om det [her](#).

Regler og lovstof

Indberetninger 2022

Frister for fællesskema:

- D. 22. april er frist for rettidig indsendelse.
- D. 17. maj er frist for indsendelse af ændringer i skemaet og af forsinket ansøgning. Denne dato er sidste gang der kan overdrages betalingsrettigheder, der som bekendt falder bort fra 2023.

Miljøteknologi 2022 udskydes fra maj til august

Miljø- og climateknologi 2022 var planlagt til at åbne i maj 2022, men ordningen udskydes og ansøgningsrunden er nu sat til at åbne i slutningen af august med ansøgningsfrist engang i oktober 2022. Først efter ordningen har været i høring i juni kan vi få en indikation af, hvad der bliver muligt at søge tilskud til.

Læs mere her: [Nye datoer for ekstern høring og ansøgningsrunde for Miljø- og climateknologi 2022 - Landbrugsstyrelsen \(lbst.dk\)](#)

Kontakt Mona H. Christensen, mhc@hortiadvise.dk, hvis du tænker på at søge tilskud, når ordningen åbner.

Nyt om kemi

Sprøjtefrister

Vedrørende sprøjtefrister, antal behandlinger, afstandskrav og restriktioner vedr. antal behandlede ha. henvises via midlernes hyperlink her i nyhedsbrevet til <https://middeldatabasen.dk>.

Det er brugerens eget ansvar, at alle regler omkring anvendelse bliver overholdt. Følg derfor link på de enkelte midler til middeldatabasen.

Godkendelser til mindre anvendelse

En del af plantebeskyttelsesmidlerne der bruges i grønsagerne, er godkendt med den godkendelse der kaldes ”mindre anvendelse”. Ved brug af produkter på listen over mindre anvendelse, er det VIGTIGT, at godkendelsen ligger udskrevet i kemiskabet/kemirummet, så den aktuelle anvendelse (dosering, opblanding m.m.) altid er lige ved hånden, når der skal blandes kemi op.

Listen over plantebeskyttelsesmidler der er godkendt til mindre anvendelse findes via dette [link](#).

Nyt om kulturerne

Salat og kål

Generelt

Jordtemperaturen forventes at komme op omkring det to-cifrede fra næste uge, så plantevæksten bør komme godt i gang nu. På grund af de lave jordtemperaturer og udbredt nattefrost har de første plantehold af kål og salat været kraftigt hæmmet i udvikling og der er da også set deciderede frostskafer, hvor planterne er blevet direkte skadet og i det mindste sat noget tilbage i vækst.

Afhærdning

Det er stadig aktuelt at afhærde hold af salat og kål på en hærdeplads. Der kræves først og fremmest godt læ og en høj placering i terrænet, så arealet ikke oversvømmes af overfladevand, der evt. kan videreføre smitte med kålbrok eller drukne rødderne på de små planter. Man skal kun dække planterne med fiberdug på hærdepladsen, hvis der er udsigt til nattefrost. Sørg altid for god opvanding af potter/bakker, da det også har en god buffervirkning ved let nattefrost.

Dækning med et eller to lag fiberdug

Der har i høj grad været brug for to lag dækning i de første plantehold, men nu begynder det sandsynligvis at blive markant lunere i vejret og man vil kunne nøjes med at have et enkelt lag fiberdug over kulturen. Dermed forbedres lysindstrålingen også, så planterne ikke bliver for ranglede og lyse. Skiftet fra to til et lag fiberdug passer også med, at der de fleste steder vil være behov for både ukrudtsrensning og eftergødskning. Nogle vil spørge sig selv, om fiberdug helt kan undværes fra nu af. Det korte svar er nej, da april og starten af maj altid vil byde på mange kølige dage og nætter, hvor der vil være direkte væksthæmning af fiberdugen. Så længe, vi ikke har dagtemperaturer over 15 °C i længere tid, er der ingen fare for varmeskafer i følsomme kulturer som blomkål og broccoli. Fiberdug giver også beskyttelse mod både vildtgrav, haglskafer og tidlige angreb af skadevoldere som f.eks. Den lille Kålflue.

Salat

Gråskimmel

Vi ser også i år planter, der er skadet af frost eller slag af fiberdug. Der er en reel risiko for angreb af gråskimmel i disse sår, så der kan være behov for en behandling med et godkendt fungicid. Hold godt øje i kulturen og behandl evt. med [Signum WG](#) eller Switch 62,5 WG, der har en [mindre anvendelse](#) mod gråskimmel. Begge disse midler indeholder systemiske aktivstoffer og vil derfor have en vis virkning, hvis der sprøjtes gennem fiberdugen. Signum WG har også effekt mod knoldbægersvamp, der kan være et problem i forårsplantningerne. Scala ([mindre anvendelse i salat](#)), samt [Serenade ASO](#) (godkendt i økologi i salat), er kun kontaktvirkende (Scala også lokalsystemisk) og rent forebyggende, så her må man evt. behandle lige efter plantning, inden dækning, eller når dugen er løftet i forbindelse med andre operationer.

Kål

Kålskimmel

Der ses af og til kålskimmel på de planter, der leveres fra tiltrækkerne; som regel kun på kimbladene, hvor det sjældent har den store betydning, da de falder ret hurtigt af. Tjek planterne for angreb på de blivende blade, da dette godt kan give anledning til bekymring. Vi har ikke de store muligheder for at bekæmpe et angreb, men man kan i det mindste påpege og dokumentere det overfor leverandøren, så de bliver klar over det og kan ændre i produktionsforholdene for de kommende leveringer. I de fleste tilfælde går angrebet af kålskimmel over "af sig selv", når planterne kommer ud på friland, men i forårsmånederne, hvor der er dækket med fiberdug, vil sygdommen kunne overleve på planterne og evt. sprede sig yderligere under den blafrende dug. Mere alvorlige angreb kan blive systemiske i planten og give sig udslag i form af vækstforstyrrelser senere hen.

Vi har ingen effektive midler mod aktiv kålskimmel. Dog er Revus godkendt med en [mindre anvendelse](#) i broccoli og kan holde et mindre angreb nede.

Ukrudtsbekæmpelse i kål

Fremspiringen af ukrudt har været relativt beskeden i år pga. de meget kolde forhold. Lidt senere på foråret vil behovet uvægerligt stige for en behandling med et eller flere jordmidler. Det er dog yderst vigtigt at undlade behandling, hvis der er risiko for nattefrost eller en længere periode med koldt og vådt vejr.

Både [Stomp CS](#) (pendimethalin), [Command CS/Clomate](#) og [Centium 36 CS](#) (clomazon) er godkendt med en mindre anvendelse i både rosenkål, hoved- og blomsterkål. For at opnå den bredeste effekt mod ukrudt anbefales det generelt at blande aktivstofferne pendimethalin og clomazon.

I perioder uden frost, og når udplantningsplanterne er i god kondition, viser erfaringer fra tidligere sæsoner, at 1 l Stomp CS i blanding med 0,1-0,15 l Command CS/Clomate/Centium 36 CS pr. ha er effektivt uden at skade kålen. Hvis forholdene ikke er optimale, skal man være påpasselig med blandingen.

Blomsterkålene er generelt de mest følsomme over for clomazon. Ukrudtseffekten af disse jordmidler er altid klart bedst på fugtig jord.

Vær opmærksom på, at der markedsføres andre midler med clomazon som aktivstof, men at det kun er Command CS, Clomate og Centium 36 CS, der har en mindre anvendelse i rosenkål, hoved- og blomsterkål.

Stomp CS må kun anvendes 1 gang pr. sæson og clomazon midlerne kun 1 gang hvert 3. år på samme areal. For samtlige af disse mindre anvendelser gælder, at der må behandles senest 3 dage efter udplantning.

Løg

Ukrudtsbekæmpelse efter fremspiring i konventionelle sætteløg

I år hvor vi ikke har Xınca, skal der første gang bruges 0,5 [Fenix](#) alene, eller hvis sætteløgene er i god vækst og der er fremspiret ukrudt, kan der bruges blandinger af 0,5 Fenix + 0,3 [Lentagran 45 WP](#). Anden gang (6-8 dage senere) bruges 0,6 Fenix + 0,3 Lentagran. Hvis der er stort ukrudt, kan der iblandes 0,1 [Starane](#) 333 HL eller 0,4 [Boxer](#). Der må ikke behandles, hvis der er frost om natten.


Fenix må anvendes både lige efter sætning samt 2 gange på fremspiret ukrudt. Intervallet hedder 8-10 dage fra sætning til første Fenix sprøjtning, og 8-10 dage til den næste og sidste sprøjtning. Brugsanvisningen tager ikke højde for, at intervallerne kan blive længere i koldt vejr, men da beskrivelsen i brugsanvisningen er lig med behandlingsfristen, skal den følges bogstaveligt. Det kan betyde, at der kun er plads til 1 sprøjtning med Fenix i sætteløg efter fremspiring. Opmærksomheden på dette skal nok især rettes mod de løg, der skal sælges tidligt som bundtløg.

Er der kamille, brandbæger eller tidsler, kan der sammen med Fenix og Lentagran anvendes 0,035 kg [Matrigon 72 SG](#) pr. ha. Matrigon er bedst til tidsler og fliget brøndsøl, mens Lentagran er bedst til gul okseøjle og brandbæger.

Mod græsser (også enårigt rapgræs) bruges [Focus Ultra](#). Sprøjtningerne passes ind, så løgene kan have fred i 3-4 dage, inden der sprøjtes med Fenix og Lentagran. Der skal i alt bruges 5 l pr. ha, eller kom tidligt ud med 2,5 l pr. ha. Der skal medtages 0,5 Dash ved sprøjtningerne. Ifølge produktoplysningerne må der kun behandles en gang pr. sæson. Focus Ultra er ikke noget vidundermiddel, så der skal Fenix med i planen, for at græsserne dør.

Ukrudtsbekæmpelse i konventionelle såløg efter fremspiring

Det er jo 1. år hvor vi ikke må bruge Xince og andre bromoxynilmidler. Så her kommer strategien for den tidlige ukrudtsbekæmpelse efter fremspiring.



Når løgene lige er kommet op, kun har faneblad og vimpen ikke er foldet ud, kan der bruges 0,1 l [Fenix](#) pr. ha. eller 0,2 [Boxer](#). Dette skal **kun** gøres, hvis der er rigtigt meget ukrudt, fordi der er **stor risiko** for skader på løgene. I den kritiske periode, se figuren, må der helst ikke behandles og slet ikke hvis det er koldt og vådt. Når løgenes 1. blivende blad er 2-3 cm, bruges 0,15 l Fenix pr. ha. Der må kun sprøjtes, når der er vokslag og der må ikke være frost 1-2 nætter før eller efter.

Hvis der ikke er udbragt Stomp før fremspiring, kan det stadig gøres på fugtig jord efter regn eller vanding, når løgene har minimum et blivende blad på 8 cm og vokslaget er gendannet. Vær opmærksom på, at Stomp CS kun må anvendes én gang, så hvis der er sprøjtet før fremspiring, må den ikke anvendes efter.

Senere når løgenes andet blivende blad er 4-5 cm skal der laves blandinger med Fenix og Lentagran. 1. gang med 0,2 Fenix + 0,2 Lentagran. Senere øges doseringerne.

Hvis der er vanskelige arter som kamille, gul okseøj, hanekro m.fl. kan der i de sidste Fenix og Lentagran-blandinger yderligere bruges [Starane](#) eller [Matrigon 72 SG](#). Starane og Martigon må kun anvendes en gang.

Ligesom i sætteløgene skal sprøjtning med [Focus Ultra](#) mod græsser (enårigt rapgræs) passes ind, så løgene kan have fred i 3-4 dage, inden der sprøjtes med Fenix. Der skal i alt bruges 5 l pr. ha, eller kom tidligt ud med 2,5 l pr. ha. Der skal medtages 0,5 Dash ved sprøjtningerne. Ifølge produktoplysningerne må der kun behandles en gang pr. sæson. Focus Ultra er ikke noget vidundermiddel, så der skal Fenix med i planen, for at græsserne dør.

Brænding i økologiske løg

I sætteløgene kan ukrudtet brændes, efter at løgene er spiret frem. Der kan brændes indtil 2 blade. Det kan også gøres senere, men så sættes løgene en del tilbage.

I såløgene skal der brændes 1-2 gange før fremspiring. Der skal holdes øje med vejrudsigten. Det er bedre at brænde en dag eller to for tidligt, end ikke at få det gjort. 2. brænding kan godt være, når der er spiret lidt løg frem, men de må absolut maksimalt være 1 cm høje. I praksis må der højst være spiret 10 % løg frem.

Porre

Vær opmærksom på "frisk" porrerust i de overvintrende porrer. Det kan meget vel udvikle sig til et lokalt problem. Der er desværre ikke meget at gøre i denne sæson, men plant ikke porrer på arealer med tidligere problemer med porrerust. Porrerust er meget specifik på porrer og vil helt sikkert finde vej til nye porrer på samme arealer.

For at fremme vækst og den grønne farve i de overvintrende konventionelle porrer, kan der sprøjtes med 5 kg urea eller 1-2 gange 3 kg bittersalt/magnesiumsulfat.

Gulerødder

Ukrudtsbekæmpelse i de tidlige

Selvom det er koldt derude, er der fin vækst i de tidlige gulerødder, hvor der begynder at kunne ses det første løvblad. Der er heldigvis kommet tilpas med vand generelt i DK, så der god fugtig jord ved de frø, som måske er blevet sået lidt for øverligt. Det er nu snart aktuelt med sprøjtning med [Fenix](#) i de konventionelle. Nu hvor gulerødderne har sat første løvblad, tåler de ofte 0,5 l Fenix pr. ha. Ifølge etiketten må man anvende 2 x 0,5-0,75 l Fenix pr. ha efter fremspiring. Pas på med Fenix under fiberdug, risikoen for skader bliver mindre ved at sprøjte hyppigere med lavere dosering. Se GrønsagsNYT nr. 3 for listen over plantebeskyttelsesmidler i gulerødder.

De økologiske skal renses, så snart man kan se rækkerne, dog uden at dække planterne over med jord. De er stadig dækkede med fiberdug og eller plastik. Og det er uhyre vigtigt, at det kommer på igen, for at gulerødderne rent faktisk bliver tidlige. Gulerødderne får et kuldechok, når dugen bliver taget af, og skal de i gang igen, er det vigtigt at dugen kommer på med det samme efter rensning.

Efterårsgulerødder

Det er ved at være tid til at så gulerødder der skal høstes i efteråret.

Igen gælder det i de konventionelle, at der primært anvendes [Stomp CS](#) og [Fenix](#) som jordmidler inden gulerøddernes fremspiring. F.eks. 1,6 l Stomp + 1 l Fenix pr. ha. For at sikre tilstrækkelig mængde Fenix til ukrudtsbekæmpelse efter gulerøddernes fremspiring, kan man alternativt erstatte Fenix før spiring med 0,2 l Command CS pr. ha. Se nærmere i GrønsagsNYT nr. 3.

I de økologiske har der til såning af efterårsgulerødder mange steder været mulighed for at lave et falsk såbed, så ukrudtet lidt nemmere kan holdes nede efterfølgende. Her gælder det selvfølgelig om at få sat det falske såbed op så hurtigt som muligt og få det holdt rent for ukrudt med strigling/ bedhøvl og brænding af bedene. Lige før fremspiring skal det sidste ukrudt brændes væk.

Sandflugt

Selvom det har regnet lidt ind imellem, kan der stadig være risiko for sandflugt på de lette jorde. Gulerødder sået på let jord bør derfor sandflugtssikres. Det gøres f.eks. med:

- Fiberdug der beskytter effektivt mod sandflugt
- Kompost eller omsat dybstrøelse spredt på jordoverfladen i et meget tyndt lag efter såning, eller inden såning, men da skal man være obs på at kunne så i det efterfølgende, så det kræver måske en overkørsel med en strigle for at få det fordelt ordentligt.
- Vårbyg: 30-40 kg pr. ha sået 4 uger før gulerødder. Gulerødderne bliver herefter sået direkte i kornet. Inden gulerøddernes fremspiring, nedvisnes kornet med Roundup. Kornet vælter efter 10-14 dage og giver hermed lang tids beskyttelse mod sandflugt.
- Korn mellem rækkerne, gerne sået en uge før gulerødderne, så de giver effektivt læ, når gulerødderne spirer frem. Kornet renses væk, når gulerødder har sat første løvblad.
- Lim i form af Emupol, som sprøjtes på jordoverfladen før fremspiring eller lige efter fremspiring og i de områder af marken, hvor risikoen er størst. Emupol tåler dårligt nedbør og sprøjtes umiddelbart inden risiko for sandflugt.

I de konventionelle gulerødder skal man være opmærksom på, at selv let sandflugt (som ikke nødvendigvis skader gulerødder) kan gøre skade, når vinden flytter rundt på de ukrudtsmidler, der anvendes inden fremspring og som bindes hårdt til sandkornene (Fenix og DFF). Skaden sker enten, fordi der overdoseres, når sand flyttes ind i rækkerne, eller pga. ukrudtsproblemer, når sand flyttes ud af rækkerne. Sådant en mark bliver efterfølgende vanskelig at sprøjte, fordi der opstår store ukrudtsproblemer i nogle områder og herbicidskader i andre områder.

Pastinak, Persillerod og Rødbede

Det er stadig lige tidligt nok at så pastinak, persillerod og rødbede; især med det kolde forår, der kun hæver jordtemperaturen meget langsomt.

Men det kommer tættere på, så vær klar, og hav styr på det falske såbed i de **økologiske**. Tidlige pastinakker og persillerødder kan evt. sås midt i april, hvis de dækkes med fiberdug. Rødbederne bør vente til først i maj og stadig under forudsætning af, at de dækkes med fiberdug.

Asparges

Hvor der er dug på aspargesmarkerne eller minitunneller vil jorden være varmet noget op efterhånden. På almindelig friland er jordtemperaturen skuffende lav, se link til jordtemperaturen i starten af nyhedsbrevet.

I de grønne aspargesmarker er der fortsat ikke meget at gøre. Ukrudtsbekæmpelsen udsættes så længe som muligt til lige før fremspiring.

Hvor der satses på mekanisk ukrudtsbekæmpelse, er det især vigtigt at holde øje med skududviklingen. Husk at grave ned til planterne og holde øje med dem, så du ikke kommer for sent. Husk også at aspargesplanter "kravler" op, så undersøg plantedybden i flere marker.

Plukærter

Ærterne står nu med ét til flere bladpar under 1-2 lag fiberdug. Vi forventer ikke problemer med bladrandbiller foreløbigt. Det har været tørt i marts måned, så der bør ikke være store problemer med rådne frø i den kolde jord.

Ukrudtsbekæmpelse i udækkede ærter før fremspiring: Har du erfaring for, at Stomp CS og Fighter 480 behandling efter fremspiring ikke er tilstrækkelig i udækkede ærter, kan du give et jordmiddel lige efter såning på fugtig jord. Valget står mellem op til 2,4 l/ha [Novitron DAM TEC](#) eller 1,5-2,5 l/ha [Fenix](#) (70 dages behandlingsfrist). Husk, at det kun er lovligt at bruge et Clomazonholdigt middel, som f.eks. Novitron hvert 3. år på samme areal.



Figure 1: Ærter under ét lag fiberdug i det indre af landet.

I økologiske ærter kan der strigles inden ærterne kommer op, herefter er det radrensning som gælder.


Projekter

Øget fosforudnyttelse i grønsager

Et stort fire-årigt GUDP-projekt i samarbejde med Aarhus Universitet er tæt ved at nå sin afslutning, med sidste projektår for HortiAdvice i år. Projektet er støttet af Promilleafgiftsfonden for frugtavl og gartneribruget.

Der er blevet arbejdet med afprøvning af forskellige fosforgødninger, brug af forsurende gødninger, dyrkning af efterafgrøder forud for fosforkrævende planter og placeret fosfor.

Herunder ses et par af forsøgsresultaterne fra år 2020 i såporrer, det viser tydeligt, at placeret gødning gav både øget friskvægt og tendens til højere P-optag i porrerne.



Arrangementer 2022

Dato	Arrangement
4. maj	Temadag om vask af frisk frugt og grønt, senest tilmelding d. 29. april, se link
27.-29. maj	Roskilde Dyrskue, Roskilde, se link
9. juni	Sommerudflugt og -ukrudtsmarkvandring på Fyn i Avlerforeningen af Danske Spiseløg
15. juni	Øko-markdag, Erholm, Aarup, se link
17.-19. juni	Det Fynske Dyrskue, Odense, se link
29.-30. juni	Borgeby Fältdagar, Borgeby, Sverige, se link
30. juni-2. juli	Landsskuet, Herning, se link

REDAKTØRER



Ole Scharff
Tlf: 40 73 19 58
ohs@hortiadvise.dk



Karina Frandsen
Tlf: 21 64 80 85
kfr@hortiadvise.dk



Dan H. Christensen
Tlf: 21 65 50 51
dach@hortiadvise.dk



John N. Schmidt
Tlf: 21 42 14 38
josc@hortiadvise.dk



Julie Schou Christiansen
Tlf: 21 59 81 54
juch@hortiadvise.dk



Pernille Kynde
Tlf: 30 51 62 14
pbk@hortiadvise.dk



Richard de Visser
Tlf: 30 53 87 16
rdv@hortiadvise.dk



Peder Krogsgård
Tlf: 40 37 46 51
pkl@hortiadvise.dk



Lars Møller
Tlf: 40 84 30 11
lars@hortiadvise.dk

HortiAdvice tager forbehold for tastefejl og lignende. Nyhedsbrevet må ikke videresendes. HortiAdvice har copyright på billederne