



03. Maj 2023



16. Maj 2023



Få blade og små blade → frugterne drysser lettere af



Udtynding



- Blomstring - kemisk
- Hele klaser - før eller efter blomstring (?)
- Håndudtynding:
de mindste vil også være de mindste ved høst
fjern de mindste
1 - 3 frugter i hver klase





- Cerone må bruges indtil frugten er 30 mm i diameter.
- Kun aktuelt i de seneste sorter Jonagored og Elstar med STOR frugtsætning nu, som IKKE tidligere i år er behandlet med Cerone.
- Ved sorter, som modner tidligere end Elstar og Jonagored, er der fare for at behandling nu, påvirker modningen senere i sæsonen.
- Lave doseringer (maks. 150 ml/ha) når junifaldet er HELT afsluttet, vil næppe have udtyndingseffekt, men kan påvirke dannelsen af **blomsterknopper** til næste år.
- Cerone brugt når junifaldet er i gang, vil øge det naturlige junifald!!!

Pærer: Cerone brugt omkring blomstring → ikke behov efter høst



Kontrolleret tørkestress

Hold igen med vandingen. Dette giver træerne en lidt stress.

Rodbeskæring *information til en anden god gang....*

Kan udføres i juli eller august

Ofte bedre farvedannelse → lidt tidligere høst → lidt mindre størrelse

Vær obs på at en kraftig rodbeskæring i 2023 også vil have effekt i 2024.

Så hold lidt igen da træerne ellers ikke vil kunne bære stort udbytte i 2024.

Gødning

Æbler har brug for mindre gødning end pærer

Pærer: 20 kg/ha/måned N

Æbler: 10-12 kg/ha/måned N

Ved lille frugtbelastning/storfrugtede sorter skal der holdes igen med gødningen

Undlad helt gødning eller giv 8 -10 kg/ha/måned N

Calcium: Husk at starte rettidigt med Calcium og kør mange gange i alt

- Disp.: 25. april 2023 til 8. juli 2023 og 1. august 2023 til 9. september 2023
- Må kun anvendes til frugtudtynding og forebyggelse af tidligt frugtfald

Anvendelse	Dosis, l/ha	Tidspunkt	Interval (dage)	Behandlingsfrist
Frugt-udtynding	1,0	Frugt har en dia. på 8-12 mm	-	90
Forebyggelse af tidligt frugtfald	0,75	Når frugten for alvor begynder at modne.	8-12	7 Max 2 behandlinger

- Pomoxon Extra kan bruges til frugterne er op til 13-14 mm i diameter
- Ikke senere da det kan resultere i mindre frugtstørrelse

Storfrugtede sorter – erfaring i udlandet

- NAA-sprøjtning påvirke størrelsen med 3-5 mm
- 3 behandlinger med 10 dages interval
- 3 x 10 gram aktivstof/ha for eksempel med 100 ml/ha NAA (10% aktivstof)

Pomoxon Extra: 29 g/liter = 2,9 g/100 ml = 345 ml af Pomoxon Extra

Clara Frijs – drys før høst

- Årsager:
- Frugter uden kerner/frost?
- Tørkestress/Varmestress?
- Høj mængde Cerone?



Pomoxon Extra mod tidligt frugtfald i Clara Frijs

- Hvis man har erfaring for, at Clara Frijs begynder at drysse før høst, kan man prøve at mindske dette ved brug af Pomoxon Extra.
- Brugt tæt på høst ses ikke påvirkning af frugtstørrelsen (generelt er aktivstoffet ikke godt for træernes trivsel, idet det sætter træerne "tilbage", men denne negative effekt af lave doseringer op til høst er lille).
- Behandling så tæt op til høst som 1 uge før høst, vil have effekt, men det anbefales at begynde 10-14 dage før høst.
- Dosering: 10 gram/ha aktivstof NAA i hver behandling. 10 gram/ha aktivstof NAA svarer til 0,35 l/ha Pomoxon Extra (29 gram/liter NAA).
- Der behandles 1-2 gange. Eftersom der plukkes over et stykke tid, bliver noget behandlet 1 gang, mens det man først når til at plukke senere bliver behandlet 2 gange.
- Behandlingsstrategi:
10 dage før forventet plukkestart lægges behandling nr. 1.
8 dage senere lægges behandling nr. 2 i den del af marken/parcellen, som man først når til at plukke senere.

Eksempel:

Dato		
10. august	1. sprøjtning (0,35 l/ha)	1. sprøjtning (0,35 l/ha)
18. august		2. sprøjtning (0,35 l/ha)
20. august	Plukkestart	
25. august og frem		Plukkestart



Lucas


03. Maj 2023

28-04-2023

- Lave temperatur - kun aktuelt med GA3 (Falgro tablets).
- Temperaturen skal som minimum være 12°C grader men gerne mere. Er der udsigt til 14°C er det absolut en fordel.
- Behandlingen udføres fra begyndende blomstring til fuld blomstring.
- I gamle træer bruges 3 tabletter.
- I unge træer ville det være optimalt med 6 tabletter (og evt. gentaget behandling), men i henhold til tilladelsen må højst bruges 1 x 5 tabletter.

09-05-2023

- Når temperaturen er over 18°C, er det varmt nok til Promalin (1,9% GA4/7).
- Brug 250-350 ml.
- Det er også stadig muligt at bruge Falgro GA3 tabletter.
- Hvis der endnu ikke er udbragt GA3 kan der blandes:
- Promalin 250-350 ml og 3 stk Falgro GA3 tabletter.



- Nogle kørte GA3 mandag 1. maj.
- Lucas: Bladgødskning 2 x om ugen: Hvis der bliver sat meget frugt, skal træerne tilføres næring, så de kan understøtte sætning af frugten.
- Ellers risiko for "konkurrence-situation" og for at træet smider noget af frugten.