

Conference på grundstammen Q Eline i to-toppe-system på forsøgsstationen Randwijk i Holland. Træer på Q Eline kræver ekstra fokus på vanding og gødning.

Conference kan vi selv dyrke



Klimaforandringerne gør det muligt at dyrke pærer af sorten Conference af god kvalitet under danske forhold

✍️ Maya Bojesen, HortiAdvice, og Jan Peeters, Fruitconsult, myb@hortiadvise.dk

📷 Jos de Wit og Maya Bojesen

Selvom navnet klinger fransk, stammer pæresorten Conference oprindeligt fra England, hvor den vandt førsteprisen i 1885. Når frugtavlere herhjemme tænker på sorten, er det først og fremmest som bestøver til Clara Frijs og som importerede pærer i supermarkedet. Flere forhold gør, at vi må spørge os selv, om tiden er moden til seriøs satsning på dyrkning af sorten i Danmark.

Varmere

Årets gennemsnitstemperatur i Danmark er nu på niveau med forholdene i Holland i 1990'erne. Højere sommertemperaturer og længere vækstsæson betyder, at det er muligt at dyrke Conferencepærer af god kvalitet i Danmark. Forudsat, at der er vandingsmulighed, ses det, at plantninger med sorten i Danmark klarer sig udmærket. Samtidig har vi indenfor de senere år set, at hvis temperaturen er høj om sensommeren, bliver der udfordringer med, at Clara Frijs modner meget hurtigt, og dermed bliver plukkevinduet kort.

Marked

Satsning på en seriøs produktion af danske Conferencepærer vil udvikle det danske pæreforbrug yderligere og gøre det muligt at forsyne det danske marked med egne pærer over en længere periode. Markedet er allerede opbygget, så risikoen ved at begynde med Conference er begrænset. Ved at dyrke Clara Frijs, Conference, Lucas og Xenia vil det danske marked kunne være dækket af dansk producerede pærer fra september til april.

Plantesystem og Q Eline

I forhold til plantesystem kan man overveje 'to-toppe træer' plantet på 120 cm afstand eller 'run-through' spindeltræer plantet på 80 cm afstand. Run-through er træer, hvor topskuddet ikke er klippet tilbage i planteskolen eller er skåret tilbage meget højt. Træet har således fra starten en relativ kraftig midtstamme.

Skrub på frugten er en velkendt sortsegenskab ved Conference. Ved brug af grundstammen Q Eline mindskes tendensen til skrub, så frugterne fremstår med glattere overflade. Ved plantning på Q Eline skal man imidlertid være ekstra påpasselig med vanding og gødning ikke mindst i etableringsårene, da tilvæksten ellers går i stå. Når først træer på Q Eline har etableret sig, gør de det godt. Hvis nogen danske frugtavlere vil gå i gang med større plantninger af Conference, vil plantning på Q Eline have den fordel, at frugterne udseendemæssigt vil overgå de importerede pærer.

Bestøver

Ideelt set bør bestøversorten udgøre 5-10 procent af arealet. Den bedste bestøver er

en diploid sort, der blomstrer lidt før hovedsorten, og som blomstrer rigt hvert år. Det bør også være en sort, hvor frugterne adskiller sig udseende- eller modningsmæssigt fra hovedsorten, så de ikke bliver blandet under plukningen. Endelig bør sorten også være robust overfor sygdomme. I Holland bruges Doyenne du Comice som bestøver til Conference, men sorten har nogen tendens til vekselbæring. Herhjemme kunne Herrepære være en mulighed. Clara Frijs som bestøver til Conference er måske også en mulighed, men Clara Frijs har tendens til vekselbæring – navnlig hvis den ikke udtyndes.

Skurv

Mange af de udenlandske undersøgelser og erfaringer med pæreskurv er fra sorten Conference. I udlandet blev Conference førhen kategoriseret som modstandsdygtig mod skurv, men betragtes i dag som meget modtagelig. Om det også er tilfældet herhjemme, er uvist. Der er mange ubesvarede spørgsmål omkring pæreskurv. Større satsning på pærer i Holland og Belgien fremfor æbler betyder øget behov for mere viden om pæreskurv. Der pågår omfattende forskning på forsøgsstationen Randwijk i Holland.

Stemphylium og bladlopper

Som andre pæresorter kan sorten blive angrebet af svampesygdommen *Stemphylium*. I Danmark er der ingen midler godkendt mod *Stemphylium*. Der er meget ved

Stemphylium, som der fortsat ikke findes viden om, men én ting går igen: Der ses en sammenhæng mellem træernes kondition og angreb. Træer, som af den ene eller anden årsag er svækkede, er mere udsatte for angreb.

Pærebladlopper er en anden skadevolder, som kan blive en udfordring fremadrettet. Movento SC 100 bliver forbudt 31. oktober 2025. De seneste års erfaringer med Siltac SF giver imidlertid forventning om, at angreb af pærebladlopper kan klares med Siltac SF.

Udtynding og vækstregulering

Det er først, når træerne bliver omkring 10 år, at der kan være behov for udtynding. De fleste, som har udtyndet Clara Frijs med Pomoxon, har bemærket, at Conference-træerne indimellem ikke tåler midlet. De pærer, som ikke falder af, bliver små og skrubne. Når der er behov for kemisk udtynding i Holland og Belgien, anvendes Brevis. Ændrede beskæringsprincipper betyder imidlertid, at kemisk udtynding generelt set ikke er et tema i sorten. I Danmark er det kun Regalis Plus, som er godkendt til anvendelse i pærer – Kudos er det ikke.

Forsøg på Randwijk i 2020-2021 med prohexadion-calcium, der er aktivstof i de to midler, viser hæmning af dannelsen af blomsterknopper til året efter. Brug af midlerne bevirker 15-20 procent færre blomsterknopper året efter. Derfor anbefales kemisk vækstregulering med disse produkter ikke i pærer. ■



Frugterne får en finere overflade, når der plantes på grundstammen Q Eline.



Pærer i Holland

- Produktionen er steget de seneste 25 år og er nu på omkring 10.100 ha.
- Heraf udgør arealet med Conference cirka 8.000 ha.
- Udbyttet ligger på omkring 45 tons pr. ha, men nogle avlere har gennemsnitsudbyttet på 60-65 tons pr. ha.
- 80 procent af de hollandske pærer eksporteres til en lang række europæiske lande.

Promilleafgiftsfonden
for frugtavl og gartneribrug

Rød Conference er en forholdsvis ny klon. Arealet med Rød Conference er kun på 15-20 ha i alt i Holland og Belgien.