

Busk- og stenfrugtNYT

Nr. 7 // 1. august 2023.



Sætningen og udbyttet i solbær (Ben Lomond) og surkirsebær (Stevnsbær) ser tilfredsstillende ud. Bærrene har fået en god størrelse efter, at der kom regn. Stikkelsbærhøsten var lav i år. Bærrene var små pga tørken i foråret, og høsten skete lige inden der kom regn. Hvide ribs af sorten Blanka dyrkes økologisk hos Thy ØkoBær. Foto: Ejnar Schmidt, Harald Krabbe og Stine Bach Nielsen.

Aktuelt

Kirsebær og buskfrugt høsten er i fuld gang. Der høstes Fanal, Nefris og Kelleriis, samt solbær.

Juli har budt på meget regn og ustabilt vejr over hele landet. Dog er der stadig tørt, især på Bornholm, men generelt i den sydøstlige del af landet. Her er det stadig aktuelt at holde øje med vandingsbehovet. Specielt i nyplantede arealer og på sandet jord.

Juli har været en ekstremt våd måned. Der er faldet ca. 141 mm regn som gennemsnit over hele landet.

Den gamle nedbørsrekord fra 1931 blev slået.

Især er der faldet meget regn i Midt- og Sønderjylland. Over 200 mm i nogle områder.

Udviklingen i arealer med buskfrugt og surkirsebær

Afgrødefordelingen for 2023 er offentliggjort. Det er de arealer, som er anmeldt i Fællesskemaet under årets ansøgningsrunde til ha støtte.

Afgrøde	2021 Totalt	2022 Totalt	2023 Totalt	2022 Øko	2023 Øko
Solbær	334	331	314	92	94
Ribs	134	135	112	35	37
Stikkelsbær	42	41	29	18	8
Surkirsebær	390	325	296	18	21
Surbær/Aronia	39	51	52	50	51
Blåbær	102	94	88	34	23
Hyben	111	115	113	7	7
Havtorn	36	24	25	22	23
Hyld	162	115	118	111	116

De totale arealer af solbær, ribs, stikkelsbær, surkirsebær og blåbær er blevet mindre. Arealer af aronia, hyben, havtorn og hyld har holdt sig stabilt siden sidste år.

De økologiske arealer har holdt sig stabilt på nær stikkelsbær og blåbær, hvor arealerne er reduceret. Næsten alle arealerne af aronia, havtorn og hyld er økologiske.

Nyt om kulturerne

Sprøjtefrister

Vedr. sprøjtefrister, antal behandlinger, afstandskrav og restriktioner vedr. antal behandlede hektarer henvises via midlernes hyperlink til <https://middeldatabasen.dk>. Det er brugerens ansvar, at alle regler omkring anvendelse bliver overholdt. Følg derfor linkene på de enkelte midler til middeldatabasen.

Buskfrugt



Forsøg med etablering af grøntgødning, kvælstofsamlede mikrokløver i buskrækken i økologiske aronia på Vibevadgaard på Sjælland (til venstre). Til højre: Etablering af sortsafprøvning af bl.a. solbær og blåbær på Aarhus Universitet, Institut for Fødevarer - Planter, Fødevarer og Bæredygtighed, Auning (AU, Auning).

Snegle

Ved kraftige angreb af snegle kan der behandles med [Ferrex](#) 6 kg/ha eller [Sluxx HP](#) 7 kg/ha for at få bekæmpet snegle inden høst. Det gælder både for konventionel og **økologisk produktion**.

Blomsterknopdannelse, bladanalyser og gødskning.

Dannelsen af blomsterknopper til sæsonen 2023 sker nu. Grundlaget for god blomsterknopdannelse er lys, vand og næring. Det er nu aktuelt at sikre lys særligt til tætte buske ved beskæring og næring gennem tilførsel af gødning. Bladanalyser er en vejledning til både at vurdere årets gødningsplan, i forhold til behov, men også her og nu prioriteringen af gødskning for at sikre god blomsterknopdannelse, samt gødningsstrategi for næste år.

Gødskning og sideklip

Efter høst handler det om at sikre knopdannelse til næste års høst ved at tildele gødning, eventuel sideklipping til at skabe lys og fornyelse i buskene og behandling mod skivesvamp og evt. meldug.

Tildeling af gødning planlægges med hensyn til lokale meldinger om eventuel nedbør.

Svampesprøjtninger

Bladmassen og historikken for sygdomme er afgørende for en eventuel beslutning om svampesprøjtning. Der kan anvendes Signum (ikke i stikkelsbær) frist 3 dage eller Kumulus S, **som også er godkendt i økologisk produktion, sprøjtefrist 1 dag**. Efter høst kan der stadig bruges Signum mod svampesygdomme.



Ben Lomond. Skivesvamp inficerer i maj måned, hvor der var primære sporer (ascosporer) til stede. Da vi havde en meget tør maj, er angreb ikke almindelige i år (foto til venstre er fra sidste år). Ben Lomond er følsom for meldug. Angreb ses nu i skudspidser (foto til højre). Angreb har ikke været alvorlige i år. Angreb reduceres af nedbør på 2 mm regn eller mere. Så regnbyger over sæsonen kan give en reduktion i angreb.

Kirsebær

Gråskimmel og Monilia under frugtudvikling

Vær opmærksom på gul Monilia og gråskimmel under frugtmodningen, i fugtigt vejr og særligt hvis der er skader på bær efter vind, vejr, fugle og insekter. Vær opmærksom på sprøjtefrister og risiko for pesticidrester, når høsten

kommer tættere på. Der kan anvendes [Teldor WG 50](#), [Signum](#) og [Switch 62,5 WG](#) (sprøjtefrister på henholdsvis 1 uge, 3, og 7 dage).

Grå Monilia



Grå Monilia smitter ved fugtigt vejr i blomstringen. Svampen går ind gennem blomsterne. Evt. angreb ses tydeligt nu. Visne skudspidser, med visner blomster. Vær opmærksom til næste år.

Kirsebærbladplet



Stevnsbær. Kirsebærbladplet inficerede i maj måned, hvor der var primære sporer (ascosporer) til stede. Hvis angreb ikke blev bekæmpet i maj, kan angreb ses nu. Bekæmpelse har meget lille virkning nu. Sygdommen kan forebygges til næste år ved at sørge for god omsætning af nedfaldent løv efterår og vinter. Bekæmpelse skal ske næste forår.

Ferie

Helle Mathiasen holder ferie indtil den 16. august.

Arrangementer

26. september 2023 kl 13.00.

Demonstration af økologisk aronia dyrkning. Hos Henrik Byrial, Blæsenborgvej 9, 4320 Lejre.

Det er 2. høstår og 2. år i projektet, hvor formålet er at demonstrere mulighederne for at dyrke kvælstofkrævende buskfrugt, ved brug af grøngødning.

Tilmelding på mail til HLP@hortiadvic.dk. Senest fredag den 22. september kl. 12.

Konsulent	 Hanne Lindhard Pedersen Mobil: 23826347 hlp@hortiadvic.dk
-----------	---

HortiAdvice tager forbehold for tastefejl og lign. Nyhedsbrevet må ikke videresendes. HortiAdvice har copyright på billederne

