



Bær af sorten Indigo Gem i 2018.
Høsten var lille og blev håndplukket.

Danbær

- I projektet Danbær undersøges 12 arter og 32 sorter af nye bærekulturer for egnetheden til dyrkning og maskinhøst under danske forhold.
- Danbær er støttet af Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget.

Hascap - et nyt industribær

Fem sorter af hascap er afprøvet i projektet Danbær siden 2016. De sunde buske vokser langsomt og er længe om at komme i bæring. Frostbeskyttelse i blomstringen kan være nødvendig

✍ Helle Mathiasen og Hanne Lindhard Pedersen, HortiAdvice, og Martin Jensen, AU, hmat@hortiadvise.dk

📷 Helle Mathiasen og Kim Nielsen

Honningbær, blåfrugtet gedebled, *Lonicera caerulea* eller populært hascap er nogle af navnene på disse buske af kaprifoliefamilien, som modsat almindelig kaprifolie producerer spiselige, blå frugter.

Hascap blomstrer tidligt. Til venstre den tidlige sort Aurora i fuld blomst, til højre den senere sort Kamchatska ved begyndende blomstring. Foto er taget 15. april.

Et tidligt bær

Hascap blev i 2019 godkendt som ny fødevarer i EU og kan nu også markedsføres som et spiseligt bær. Bærrene er nogle af de tidligste modnende frilandsbær. Den tidligste sort i forsøgsmarken i Årslev, Aurora, blev høstet den 30. maj i 2018. Aurora giver søde frugter og er kendt som en særdeles god bestøversort. Hascap er selvbestøvende, men krydsbestøvning øger udbyttet. Bærrene bruges hovedsageligt til marmelade og saft, men egnede sorter kan også gå til det friske marked.

En langsom starter

Hascap er sunde og nøjsomme buske med en bred tolerance overfor temperatur- og jordbundsforhold og med en lang leve- og produktionstid. Erfaringer fra marken i Årslev efter fire år viser, at der – ligesom i blåbær – må regnes med nogle år før, der er høst af betydning.

Buskene i Årslev er plantet på 0,8 x 4,0 meter. De har en langsom tilvækst, og den første men lille høst blev håndplukket i 2018, tredje sommer efter plantning. Projektet Danbær har haft til formål at afprøve nye bærekulturer til maskinhøst, hvilket derfor endnu ikke er afprøvet i hascap. Vi vurderer, at det vil være muligt at høste bærrene med en portalthøster.

Tidlig blomstring

Planterne er sunde, og vi har kun set meldug og to arter af viklere i mindre grad. Den tidlige blomstring kan dog være et problem i nogle år. Årsagen til den lille høst i 2019 formodes at være frostskaade under blomstring. Krydsbestøvningen burde være i orden, da der er fem sorter i marken, men bestøverne var måske mindre aktive i blomstringsperioden på grund af koldt vejr. Hascap blomstrer meget tidligt fra i slutningen af marts, og der var flere perioder med nattefrost over flere dage i forsøgsmarken. ■



Angreb af viklere på Hascap vurderes at være af mindre betydning for produktionen.