

Bekæmpelse af nematoder i økogulerødder

Brug af indikatorplanter


Formål


- At se om der er sammenhæng mellem antal rodgaller på salatplanterne og antal rodgallenematoder laboratoriet finder i jordprøverne.
- At se om antal rodgaller på salatplanterne og antallet af rodgallenematoderne ændrer sig henover foråret.

Metode

Der blev udtaget prøver i tre afgrænsede delparceller (1 m² pr delparcel) på én lokalitet, som blev blandet sammen og delt i 2. Den ene del blev sendt til analyse hos HLB, den anden blev fordelt i 6 små potter, hvori det blev sået 2-3 salatfrø af typen xaroma (mini romaine type). Potterne blev stillet lyst i vindueskarm/uopvarmet hobbydrivhus, og efter ca. 6 uger blev rødderne vasket og antal rodgaller talt.

Resultater





Konklusioner

- Der var meget få rodgallenematoder i den plet i marken vi undersøgte
 - **Vi skal tage jordprøven over et større areal i marken**
- Problemer med metoden med salat:
 - Dårlig/svingende vækst (lys, gødning, temperatur)
 - Stor risiko for udtørring i de små pletter
 - **Vi er i højere grad nødt til at kontrollere dyrkningen af salat, hvis de skal bruges som indikatorplanter**

Projektet har fået tilskud fra
Promilleafgiftsfonden for frugtavl og
gartnerbruget og fra Miljø- og
Fødevareministeriets
Erhvervsudviklingsordningen 2016 –
udviklingsprojekter: "Den Europæiske
Landbrugsfond for Udvikling af
Landdistrikterne: Danmark og Europa
investerer i landdistrikterne"

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne



Miljø- og Fødevareministeriet
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen



Den Europæiske Landbrugsfond
for Udvikling af Landdistrikterne

LDP 2020



ESKO

GartneriRådgivningen

Projekt 2980 Bekæmpelse af nematoder i økogulerødder