

# Brugsanvisning til mindre anvendelse af Fenix (18-417) til bekæmpelse af ukrudt i pastinak, persillerod, knoldselleri og såløg samt i frø- og prikledede med planteskolekulturer

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

## **Ansvar for mindre anvendelse og vejledning**

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

### *Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar*

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. Grøn Plantebeskyttelse ApS kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til Mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

## Vejledning for Fenix (18-417) til bekæmpelse af ukrudt i pastinak, persillerod, knoldselleri og såløg samt i frø- og prikledede med planteskolekulturer

### Ukrudtsmiddel:

- Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i pastinak, persillerod, knoldselleri og såløg samt i frø- og prikledede med planteskolekulturer
- Må ikke anvendes senere end
  1. BBCH stadie 12 (2 blade) i pastinak og persillerod
  2. BBCH stadie 14 (4 blade) i løg
  3. 70 dage før høst i knoldselleri
- Max antal behandlinger pr. afgrøde
  1. En i pastinak, persillerod og knoldselleri ved enkeltbehandling
  2. Tre i pastinak, persillerod og knoldselleri ved delt behandling
  3. Fire i løg
  4. En i frø- og prikledede af planteskolekulturer
- Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand
- Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra §3 områder for at beskytte vilde planter

### Advarsel:

"Se Fenix etiketten".

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

## Brugsanvisning for Fenix (18-417) til bekæmpelse af ukrudt i pastinak, persillerod, knoldselleri og såløg samt i frø- og prikledede med planteskolekulturer

### Skadegører: Ukrudt

### Dosering af Fenix:

Afgrøde	Sprøjtetidspunkt	Dosis l/ha
* Pastinak, persillerod og knoldselleri: Enkeltbehandling – max dosering	Før fremspiring (max 1 behandling)	2,0*
*Pastinak, persillerod og knoldselleri: Delt behandling – max dosering pr. sprøjtning	Før fremspiring (max 1 behandling)  Efter fremspiring (max 2 behandlinger)	1,0*  0,5 – 0,75*
*Såløg – max dosering pr. sprøjtning	Efter såning (max 4 behandlinger)	1,0*
Frø- og prikledede af planteskolekulturer Enkeltbehandling – max dosering	Før knopbrydning (max 1 behandling)	2,0

\*Max 2,5 l Fenix/ha i alt per år - heraf max 1,5 l Fenix/ha efter fremspiring

### Sprøjtetidspunkt:

Fenix skal anvendes på småt ukrudt (kimbladstadiet).

### Antal behandlinger:

Se doseringsskemaet under sprøjtetidspunkt.

For spiselige afgrøder må der maksimalt anvendes 2,5 l Fenix/ha i alt per år - heraf max 1,5 l Fenix/ha efter fremspiring.

*Risiko for skade:*

Pastinak, persillerod og knoldselleri:

Det anbefales at afprøve Fenix på et mindre areal, så der kan fås erfaringer inden det anvendes i stor skala.

I en sprøjtestrategi med andre herbicider kan der ske skade på afgrøden. Der bør derfor holdes afstand til andre behandlinger. Stressede afgrøder er mere følsomme overfor Fenix.

Anvendelse af penetreringsolie og/eller blanding med andre herbicider øger risikoen for skader.

Frø- og prikledede af planteskolekulturer:

Det anbefales at afprøve Fenix på et mindre areal, så der kan fås erfaringer inden det anvendes i stor skala.

Der er stor risiko for skade ved anvendelse efter knopbrydning.

27. oktober 2015