

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Kompakt 5 C (49-94) til vækstregulering af prydplanter og planteskolekulturer i åbne væksthuse

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. HortiAdvice A/S kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for Kompakt 5 C (49-94) til vækstregulering af prydplanter og planteskolekulturer i åbne væksthuse

Vækstreguleringsmiddel:

- Må kun anvendes til vækstregulering af prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter på tætte borde eller på jorden i åbne væksthuse.
- Brugsanvisningens angivelser skal overholdes.
- Hvis midlet anvendes på frugt bærende frugttræer eller frugtbuske, skal frugter fjernes før salg
- Sprøjteførere skal anvende kemisk bestandige handsker ved blanding, påfyldning og håndholdt udbringning.
- Sprøjteførere skal anvende kemisk bestandige handsker ved blanding og påfyldning ved udvanding.
- Ved håndtering af behandlede prydplanter i væksthuse skal der anvendes kemisk bestandige handsker og arbejdstøj.
- Ved anvendelse i planter dyrket i potter på jorden uden recirkulering: Potterne skal stå helt tæt (pottetæt kultur) eller kulturen skal dække arealet fuldstændigt (dækkende kultur).
- Ved anvendelse i prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter på jorden uden recirkulering: For at beskytte grundvand må der højst anvendes de i brugsanvisningen angivne maksimale doseringer pr. år. Der må endvidere i samme år ikke også anvendes andre produkter, der indeholder chlormequat chlorid på samme areal.
- For at beskytte bier må behandlede planter tidligst udflyttes 1 dag efter sprøjtning.

Advarsel:

”Se Kompakt 5 C etiketten”

Brugsanvisning

Anvendelse: Vækstregulering af prydplanter og planteskolekulturer i åbne væksthuse.

Sprøjtning i åbne væksthuse:

Afgrøde	Max dosering pr. behandling	Antal behandlinger pr. kultur (interval)	Antal behandlede kulturer pr. væksthuseareal pr. vækstår	Karensperiode for hvornår der må forekomme udflytning til containerplads med eller uden recirkulering.
---------	-----------------------------	--	--	---

Prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter på tætte borde med recirkulation.	1 x 2,6 L/ha Eller split 2 x 1,3 L/ha eller 3 x 0,87 L/ha <u>Svarende til:</u> Max. 100 liter 1 x 0,26 % opløsning pr. 1000 m ²	Max 1 eller 2-3 ved split (1-3 uger)	Max 2,6 L/ha i alt pr. areal pr. år	1 dag
Prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter på jorden . Potterne skal stå så tæt som muligt.	1 x 2,6 L/ha Eller split 2 x 1,3 L/ha eller 3 x 0,87 L/ha <u>Svarende til:</u> Max. 100 liter 1 x 0,26 % opløsning pr. 1000 m ²	Max 1 eller 2-3 ved split (1-3 uger)	Max 1 hold Max 2,6 L/ha i alt pr. år. pr. areal	1 dag

Udvanding i åbne væksthuse:

Afgrøde	Max dosering pr. potte	Antal behandlinger pr. kultur (interval)	Antal behandlede kulturer pr. væksthuseareal pr. vækstår	Karensperiode for hvornår der må forekomme udflytning til containerplads med eller uden recirkulering.
Udvanding. Prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter på tætte borde med recirkulation.	Koncentration af væske: Max 1 x 0,26 % (=260 ml/100 liter vand) 50 – 100 ml væske afhængig af pottestørrelse*	Max 1	Max 2.6 L/ha	1 dag

* Koncentration af væske: Max 0,26 % (=260 ml/100 liter vand)

Sprøjteudstyr:

Sprøjtning: Sprøjtebom eller lanse / kærresprøjte.

Udvanding: Udvanding på tætte borde med recirkulering.

Sprøjtetidspunkt:

Der behandles ved behov iht. brugsanvisningen. Doseringen justeres efter kultur, sort og årstid.
Undgå at behandle planterne i stærkt sollys.

Risiko for skade:

Ved anvendelse af Kompakt 5 C i nye kulturer og sorter, bør det afprøves på et mindre antal planter først.
Hermed fås erfaring med midlet og risikoen for skader reduceres

Dato: 15. maj 2024