

Brugsanvisning til mindre anvendelse af nedenstående metemitronholdige midler mod ukrudt i gulerod, persillerod, pastinak, rødbede og jordbær: Goltix SC 700 (396-22), Goliath (396-23), ECP Metafol 700 SE (1046-9), Metafol 700 SE (1046-12), UPL Metafol (1046-4), og Target 700 SE (1046-8)

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. HortiAdvice A/S kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for mindre anvendelse af nedenstående metamitronholdige midler mod ukrudt i gulerod, persillerod, pastinak, rødbede og jordbær: Goltix SC 700 (396-22), Goliath (396-23), **ECP Metafol 700 SE (1046-9), Metafol 700 SE (1046-12), UPL Metafol (1046-4), og Target 700 SE (1046-8)**

Ukrudtsmiddel:

- Må kun anvendes mod frøkrudt til at bekæmpe vanskelige arter som burrenerre, enårig rapgræs, liden nælde, raps, sort natskygge, hanekro og snerlepileurt i gulerod, persillerod, pastinak, rødbede og jordbær
- Brugsanvisningens angivelser skal overholdes
- Må ikke anvendes senere end de sprøjtefrister for de forskellige afgrøder som er angivet i nedenstående tabel
- Må ikke anvendes senere end den 15. august
- **Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende**
- Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand
- Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra § 3 områder for at beskytte vilde planter
- Må kun anvendes hvert 3. år på samme areal

Advarsel:

”Se midlernes etiket”

Brugsanvisning

Til anvendelse på friland

Afgrøde	Skadevolder	Max. dosering pr. behandling	Antal behandlinger	Behandlingstidspunkt	Sprøjtefrist/ PHI
Gulerod, persillerod, pastinak	Frøkrudt herunder vanskeligt bekæmpelige arter som	2,0 l/ha før fremspiring 0,5 l/ha efter fremspiring I alt max 2,0 l/ha	4	På småt ukrudt Senest på afgrødens 3 blad stadie	2 måneder
Rødbede	burrenerre, enårig rapgræs,	1,0 l/ha pr. sprøjtning I alt max 3,0 l/ha	3	På småt ukrudt	105 dage
Jordbær	liden nælde, raps, sort natskygge, hanekro og snerlepileurt	0,5-1,0 l/ha pr. sprøjtning I alt max 2,0 l/h	2	Første sprøjtning lige efter plantning på småt ukrudt Anden sprøjtning 10-14 dage senere	Må ikke anvendes i høstårene

Sprøjteudstyr: **Marksprøjte med bom**

Midlerne skal anvendes til bekæmpelse af frøukrudt på ukrudtets kimbladstadiet

Risiko for skade i gulerod, persillerod og pastinak:

Der foreligger kun få forsøg med met amitron i gulerod, pastinak og persillerod. Overordnet er erfaringen dog, at der er en betydelig risiko for afgrødeskader, og der skal udvises særlig forsigtighed på let jord og i perioder med kølige og ustadige vejrforhold.

Det anbefales derfor altid, at afprøve midlerne (met amitron) på et mindre areal med forskellige doseringer, så der kan fås erfaringer med midlerne inden de anvendes i storskala.

Når met amitron anvendes som jordmiddel før fremspiring skal man være meget varsom med efterfølgende ukrudtsbekæmpelse med f.eks. Fenix. Som bladmiddel kan met amitron medføre alvorlige svidninger, og det anbefales ikke at behandle afgrøder på kimbladsstadiet. Desuden skal der udvises stor forsigtighed med doseringen. I forsøg er der registreret svidninger ved doseringer omkring 0,5 l/ha, og især i blanding med Fenix. Generelt tilrådes stor forsigtighed ved blanding med andre midler både før og efter fremspiring.

Dato: 9. februar 2017 – opdateret 15. marts 2024