

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Mospilan SG (561-3) mod bladlus, mellus og trips i pryddplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til mindre anvendelse følges. HortiAdvice kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle arter og sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for Mospilan SG (561-3) mod bladlus, mellus og trips i prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse

Insektmiddel:

- Må kun anvendes til bekæmpelse af bladlus, mellus og trips i prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse
- Brugsanvisningens angivelser skal overholdes
- Hvis midlet anvendes på frugtbærende frugttræer eller frugtbuske, skal frugter fjernes før salg
- Ved håndtering af behandlede prydplanter og planteskolekulturer skal der anvendes kemisk bestandige handsker
- Ved anvendelse i prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter på jorden uden recirkulering: Potterne skal stå helt tæt (pottetæt kultur) eller kulturen skal dække arealet fuldstændigt (dækkende kultur). Max 2 behandlinger pr. væksthuseareal pr. år
- Udflytning må tidligst foretages 1 dag efter sprøjtning, for at beskytte bier

Advarsel:

”Se Mospilan SG etiketten”.

Brugsanvisning

Anvendelse: Mod bladlus, mellus og trips i prydplanter og planteskolekulturer i åbne væksthuse

Afgrøde	Dosering pr. behandling	Antal behandlinger pr. hold	Antal behandlede hold pr. væksthuseareal pr. år	Karensperiode for hvornår der må forekomme udflytning til containerplads med eller uden recirkulering.
Prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter på tætte borde med recirkulation, eller på tæt bund med recirkulation.	Max. 0,5 kg/ha Udbringes i 0,025-0,05 % opløsning. <u>Svarende til:</u>	2 (14 dage)	Der sættes ikke en begrænsning såfremt bordene/bund er tætte og der er recirkulation.	Uden recirkulering: 1 dag.
				Med recirkulering: 1 dag.
Prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter på jorden . Potterne skal stå så tæt som muligt.	Max. 100 L 0,05 % opløsning pr. 1000 m ² eller f.eks. 200 L 0,025 % opløsning pr. 1000 m ² *	2 (14 dage)	Max 1-2 hold. De max 2 behandlinger pr. væksthuseareal pr. år må gerne anvendes i hvert sit hold.	Uden recirkulering: 1 dag.
				Med recirkulering: 1 dag.

* 0,05 % opløsning (= 50 g Mospilan SG opløst i 100 L vand)

Sprøjtedyr: Sprøjtetomb (automatisk og manuel) og kærresprøjte m. lanse.

Risiko for skade:

Ved anvendelse i nye kulturer og sorter, afprøves Mospilan SG på et mindre antal planter først. Hermed fås erfaring med midlet, og risikoen for skader reduceres.