

Brugsanvisning til mindre anvendelse af NeemAzal – T/S (643-1) til insektbekæmpelse i prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. HorticAdvice kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle arter og sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til Mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for NeemAzal – T/S (643-1) til insektbekæmpelse i prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse

Insektmiddel:

- Må kun anvendes til bekæmpelse af bladlus, trips, mellus og minérfluer i prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse
- Brugsanvisningens angivelse af dosering, koncentration af sprøjtevæsken, antal behandlinger og interval skal overholdes
- Hvis midlet anvendes på frugtbærende frugttræer eller frugtbuske, skal frugter fjernes før salg
- Brugere skal anvende handsker og beskyttelsesdragt ved blanding, påfyldning og udbringning
- Ved håndtering af behandlede planter skal der anvendes kemisk bestandige handsker
- Ved anvendelse i prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter på jorden: For at beskytte grundvandet må der højst anvendes de i brugsanvisningen angivne maksimale doseringer pr. vækstår (1. august – 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder azadirachtin på samme areal. Max 1 behandlet kultur pr. areal pr. vækstår.
- Ved anvendelse i prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter på jorden uden recirkulering: Potterne stå helt tæt (pottetæt kultur) eller kulturen skal dække arealet fuldstændigt (dækkende kultur).
- Ved udflytning af behandlede planter til containerplads: For at beskytte grundvand må der max udflyttes 1 behandlet kultur pr. areal pr. vækstår ved dyrkning af prydplanter og planteskolekulturer. Udflytning må tidligst foretages 1 dag efter sprøjtning.

Advarsel: ”Se NeemAzal – T/S etiketten”.

Brugsanvisning

Anvendelse: Til bekæmpelse af lus, trips, mellus og minérfluer i åbne væksthuse.

Afgrøde	Max dosering pr. behandling	Antal behandlinger pr. kultur	Antal behandlede kulturer pr. væksthuseareal pr. vækstår	Karensperiode for hvornår der må forekomme udflytning til containerplads med eller uden recirkulering.
Prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter på tætte borde med recirkulation.	2,5 L/ha <u>Svarende til:</u> Max. 100 liter af max 0,250 % opløsning pr. 1000 m ² (= 2,5 L NeemAzal T/S pr. ha)*	2 (min. 7 dages interval)	Der sættes ikke en begrænsning såfremt bordene er tætte og der er recirkulation.	Uden recirkulering: 1 dag. Max 1 udflyttet kultur pr. vækstår pr. areal behandlet med aktivstoffet azadirachtin.
				Med recirkulering: 1 dag.
Prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter på jorden . Potterne skal stå så tæt som muligt.	2,5 L/ha <u>Svarende til:</u> Max. 100 liter af max 0,250 % opløsning pr. 1000 m ² (= 2,5 L NeemAzal T/S pr. ha)*	2 (min. 7 dages interval)	1	Uden recirkulering: 1 dag. Max 1 udflyttet kultur pr. vækstår pr. areal behandlet med aktivstoffet azadirachtin.
				Med recirkulering: 1 dag.

* 0,250 % opløsning (= 250 mL NeemAzal – T/S opløst i 100 L vand)

Doseringen justeres efter kultur, sort og årstid.

Sprøjtedyr: Bomsprøjte eller lanse/kærresprøjte.

Sprøjtetidspunkt:

Ved behov

Risiko for skade:

Læs etikettens oversigt over forskellige arters/sorters tålsomhed.

21. december 2020