

# Brugsanvisning til mindre anvendelse af Nissorun 250 SC (561-6) mod spindemider i pryddplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

## **Ansvar for mindre anvendelse og vejledning**

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

### *Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar*

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til mindre anvendelse følges. HortiAdvice kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle arter og sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

# Vejledning for Nissorun 250 SC (561-6) mod spindemider i pryddplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse

## Midemiddel:

- Må kun anvendes mod spindemider i pryddplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse
- Brugsanvisningens angivelser skal overholdes
- Hvis midlet anvendes på frugtbærende frugttræer eller frugtbuske, skal frugter fjernes før salg
- Brugere skal anvende kemisk bestandige handsker ved blanding, påfyldning og udbringning.
- Ved håndtering af behandlede pryddplanter og planteskolekulturer skal der anvendes kemisk bestandige handsker.
- Ved anvendelse i pryddplanter og planteskolekulturer dyrket i potter på jorden: For at beskytte grundvandet må der på samme areal højst anvendes de i brugsanvisningen angivne maksimale doseringer pr. år. Max 2 behandlinger med hexythiazox pr. areal pr. år
- Ved anvendelse i pryddplanter og planteskolekulturer dyrket i potter på jorden: Potterne skal stå helt tæt (pottetæt kultur) eller kulturen skal dække arealet fuldstændigt (dækkende kultur)
- Ved udflytning af behandlede planter til containerplads uden recirkulering: Max 1 udflyttet hold behandlet med hexythiazox pr. areal pr. år
- Udflytning må tidligst foretages 1 dag efter sprøjtning, for at beskytte bier

## Advarsel:

”Se Nissorun 250 SC etiketten”.

## Brugsanvisning

Anvendelse: Mod spindemider i pryddplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse

Afgrøde	Max dosering pr. behandling	Antal behandlinger pr. hold	Antal behandlede hold pr. væksthuseareal pr. år	Karensperiode for hvornår der må forekomme udflytning til <b>containerplads</b> med eller uden recirkulering.
Pryddplanter og planteskolekulturer dyrket i potter <b>på tætte borde</b> med recirkulation eller <b>på tæt underlag</b> med recirkulation.	0,3 L/ha  <u>Svarende til:</u> Max. 150 L 0,02 % opløsning pr. 1000 m <sup>2</sup> *	Max 2 (min. 7 dages interval)	Max 2 behandlinger med hexythiazox pr. væksthuseareal pr. år	<b>Uden recirkulering:</b> 1 dag. Max 1 udflyttet hold pr. år pr. areal behandlet med aktivstoffet hexythiazox.
				<b>Med recirkulering:</b> 1 dag.
Pryddplanter og planteskolekulturer dyrket i potter <b>på jorden</b> . Potterne skal stå så tæt som muligt.	0,3 L/ha  <u>Svarende til:</u> Max. 150 L 0,02 % opløsning pr. 1000 m <sup>2</sup> *	Max 2 (min. 7 dages interval)	Max 2 behandlinger med hexythiazox pr. væksthuseareal pr. år	<b>Uden recirkulering:</b> 1 dag. Max 1 udflyttet hold pr. år pr. areal behandlet med aktivstoffet hexythiazox.
				<b>Med recirkulering:</b> 1 dage.

\*0,02 % opløsning (= 20 mL Nissorun 250 SC i 100 L vand)

Udbringningsudstyr: Sprøjtebom (automatisk og manuel) og kærresprøjte m. lanse.

*Sprøjtetidspunkt:*

Der behandles ved behov i hht. brugsanvisningen

*Forebyggelse af resistens:*

Hvis Nissorun 250 SC anvendes mere end én gang skal midlet indgå i en strategi, hvor der imellem behandlingerne anvendes et spindemidlemiddel med en anden virkemekanisme (f.eks. Floramite 240 SC) for at forebygge resistens.

*Risiko for skade:*

Da der er begrænset erfaring med Nissorun 250 SC, bør midlet, ved anvendelse i nye kulturer og sorter, afprøves på et mindre antal planter først. Hermed fås erfaring med midlet og risikoen for skader reduceres.

29. juni 2021