

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Orius Gold (347-57) mod svampesygdomme i solbær, ribs, blåbær og hyben på friland

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning til mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til mindre anvendelse følges. HortiAdvice kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for mindre anvendelse af Orius Gold (347-57) mod svampesygdomme i solbær, ribs, blåbær og hyben på friland

Svampemiddel:

- Må kun anvendes mod svampesygdomme i solbær, ribs, blåbær og hyben på friland
- Må ikke anvendes senere end 14 dage før høst
- Brugsanvisningens angivelser skal overholdes
- Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand
- For at beskytte grundvandet må der højst anvendes de i brugsanvisningen angivne maksimale doseringer pr. vækstår (1. august - 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder tebuconazol, difenoconazol eller mefentrifluconazol med mindre doseringerne nedsættes tilsvarende

Advarsel:

”Se Orius Gold etiketten”

Brugsanvisning

Til anvendelse mod svampesygdomme på friland

Afgrøde	Dosering pr. behandling	Vandmængde	Antal behandlinger (interval)	Behandlingstidspunkt (vækststadier)	Sprøjtefrist
Solbær, ribs, blåbær og hyben	Max 0,6 L/ha	200-500 L/ha	Max 1 eller 2 ved splitdosering*	BBCH 69 - blomstring afsluttet til BBCH 81 – begyndende modning	14 dage

*der må maksimalt i alt udbringes 0,6 liter/ha pr. vækstsæson

Sprøjteudstyr:

Traktormonteret tågesprøjte (specialsprøjte til buskfrugt, som afsætter sprøjtevæsken ind i busken fra siden).

Anvendelsestidspunkt:

Anvendes ved behov fra ultimo april til medio august. Midlet optages gennem bladene og føres systemisk rundt i planten. De optimale virkningsforhold er en temperatur på ca. 20 °C (min. 6 °C) og 2 timers tørvejr efter sprøjtning.

Dato: 13. juni 2022