

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Boxer (1-211), Fidox EC (613-3), Roxy EC (613-5) og LFS Prosulfocarb (318-69) i jordskokker og knoldselleri

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. Grøn Plantebeskyttelse ApS kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle arter og sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til Mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for Boxer (1-211), Fidox EC (613-3), Roxy EC (613-5) og LFS Prosulfocarb (318-69) i jordskokker og knoldselleri

Ukrudtsmiddel:

- Må kun anvendes i jordskokker og knoldselleri til bekæmpelse af ukrudt
- Anvendelsestidspunkt:
 - I jordskokker anvendes midlerne fra lægning til afgrødens 1 bladstadie (BBCH 00-11)
 - I knoldselleri anvendes midlerne på afgrødens 2-4 bladstadie (BBCH 12-14)
- Der er 12 ugers sprøjtefrist
- Hvis midlerne anvendes efter fremspiring i jordskokker anbefales det at sprøjte et lille areal første gang, da der ikke er noget kendskab til midlernes skadevirkning på afgrøden.
- Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand

Advarsel:

"Se midlernes etiketter".

Brugsanvisningernes doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Boxer, Fidox EC, Roxy EC og LFS Prosulfocarb i jordskokker

Skadegører: Ukrudt

Dosering i jordskokker:

Prosulfocarb-midler	Dosis l/ha
	Max. 4 l/ha pr. sæson

Dosering i knoldselleri:

Prosulfocarb-midler	Dosis l/ha
	Max. 2 l/ha pr. behandling. Max. 4 l/ha pr. sæson

Sprøjtetidspunkt og teknik/udstyr: Hvis midlerne anvendes efter fremspiring i jordskokker anbefales det at sprøjte et lille areal første gang, da der ikke er noget kendskab til midlernes skadevirkning på afgrøden.

4. september 2014