

# Brugsanvisning til mindre anvendelse af Regalis Plus (19-216) til vækstregulering af prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne og lukkede væksthuse samt på friland

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

## **Ansvar for mindre anvendelse og vejledning**

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

### *Vejledning til mindre anvendelse - eget ansvar*

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til mindre anvendelse følges. HortiAdvice kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle arter og sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

## Vejledning for Regalis Plus (19-216) til vækstregulering af prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne og lukkede væksthuse samt på friland

### Skadedyrsmiddel:

- Må kun anvendes til vækstregulering af prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne og lukkede væksthuse samt på friland
- Brugsanvisningens angivelser skal overholdes
- Ved nedadrettet udbringning udendørs: Må ikke anvendes nærmere end 1 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
- Ved opadrettet udbringning udendørs: Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
- For at beskytte bier må behandlede planter tidligst udflyttes 1 dag efter sprøjtning.

Advarsel: ”Se Regalis Plus etiketten”.

### Brugsanvisning

Afgrøde	Max dosering pr. behandling (kg produkt/ha)	Antal behandlinger pr. hold (interval)	Vandmængde	Antal behandlede hold pr. areal pr. år	Karensperiode for hvornår der må forekomme udflytning til <b>containerplads</b> med eller uden recirkulering
<b>Lukket væksthuse</b> Prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter på <u>tætte borde</u> med recirkulation <i>eller</i> på <u>tæt bund</u> med opsamling/recirkulation.	0,5 - 2,5 kg/ha  Max 3 kg/ha i alt pr. hold	Max 4 (min 7 dage)	500-2000 L/ha	Der sættes ikke en begrænsning	1 dag.
<b>Åbent væksthuse</b> Prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter på <u>tætte borde</u> med recirkulation <i>eller</i> på <u>tæt bund</u> med opsamling/recirkulation.	0,5 - 1,25 kg/ha	Max 2 (min 10 dage)	500-2000 L/ha	Max 2 hold  Max 3 kg/ha i alt pr. år pr. areal	1 dag.
<b>Åbent væksthuse</b> Prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter på <u>jorden</u> . Potterne skal stå så tæt som muligt.	0,5 - 1,25 kg/ha	Max 2 (min 10 dage)	500-2000 L/ha	Max 2 hold  Max 3 kg/ha i alt pr. år pr. areal	1 dag
<b>Friland</b> (containerplads) Prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter på <u>jorden</u> . Potterne skal stå så tæt som muligt.	0,5 - 1,25 kg/ha	Max 2 (min 10 dage)	500-2000 L/ha	1 hold pr. areal pr. år	-

*Sprøjteteknik:*

Sprøjter med horisontal sprøjtebom samt håndholdte sprøjter med lanse.

*Sprøjtetidspunkt:*

Der behandles ved behov iht. brugsanvisningen.

Det anbefales at behandle tidligst 7 dage efter planterne er blevet pottet.

*Risiko for skade:*

Der er begrænset erfaring med midlet. Det bør derfor ved anvendelse i nye kulturer og sorter, afprøves på et mindre antal planter først bl.a. for at finde den korrekte koncentration af sprøjtevæsken. Hermed fås erfaring med midlet og risikoen for skader/uønskede effekter reduceres. Det anbefales at midlet anvendes tidligt i kulturforløbet. Kontakt eventuelt en af HortiAdvice's konsulenter før brug.

Vær opmærksom på at Regalis Plus affarver rød- og blåblomstrede kulturer.

Dato: 23. oktober 2023