

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Rizolex 50 FW (526-3) til udvanding mod rodtiltsvamp i pryddplanter dyrket i potter i åbne væksthuse

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til mindre anvendelse følges. HortiAdvice kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle arter og sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for Rizolex 50 FW (526-3) til udvanding mod rodfilt-svamp i pryddplanter dyrket i potter i åbne væksthuse

Svampemiddel:

- Må kun anvendes til udvanding mod rodfiltsvamp i pryddplanter dyrket i potter i åbne væksthuse
- Brugsanvisningens angivelser skal overholdes
- Må kun anvendes til udvanding på tætte borde med recirkulation
- Udflytning må tidligst foretages 1 dag efter udvanding, for at beskytte bier

Advarsel:

”Se Rizolex 50 FW etiketten”.

Brugsanvisning

Anvendelse: Udvalgt mod rodfiltsvamp i pryddplanter dyrket i potter i åbne væksthuse.

Afgrøde	Max dosering pr. behandling	Antal behandlinger pr. hold pr. år	Antal behandlede hold pr. væksthuseareal pr. år	Karensperiode for hvornår der må forekomme udflytning til containerplads med eller uden recirkulering.
Pryddplanter dyrket i potter på tætte borde med recirkulation	125 ml pr. L potte af en 0,05 % vandig opløsning* f.eks.: 8 cm potte (0,22 L): 30 mL/potte 10 cm potte (0,45 L): 50 mL/potte 12 cm potte (0,75 L): 100 mL/potte	Max 1	Der sættes ikke en begrænsning såfremt bordene er tætte og der er recirkulation.	Uden recirkulering: 1 dag.
				Med recirkulering: 1 dag.

*0,05 % vandig opløsning (= 50 mL Rizolex 50 FW i 100 L vand)

Udbringningsteknik/udstyr:

Udvanding på i forvejen fuldt opvandede planter via ebbe-flod eller via brusevanding. Brusevanding foregår uden tryk på sprøjten, så væsken ikke forstøves (små dråber), men løber ud af sprøjten i den godkendte dosering. Umiddelbart efter brusevanding skal der følges op med en nedvanding, for at mindske afdampning af aktivstof.

Risiko for skade:

Ved anvendelse af Rizolex 50 FW i nye kulturer og sorter, bør det afprøves på et mindre antal planter først. Hermed fås erfaring med midlet og risikoen for skader reduceres. Læs etiketten for yderligere info.

Godkendt 6. oktober 2021

Opdateret 26. oktober 2021