


GrønsagsNYT

Nr. 12 // 24. juli 2020.



De naturlige fjender er heldigvis på plads i mange marker som her en puppe af mariehøne. Blomsterstriber vil fremme forekomsten af flere arter af nyttedyr.

Aktuelt	1
Nyt om kemi	2
Nyt om tilskudsordninger	3
Nyt om kulturerne	3
Pesticider i GrønsagsNYT	3
Salat	3
Kål	4
Løg	6
Økologiske løg.....	7
Porrer.....	7
Gulerødder.....	8
Persillerod, pastinak	8
Rødbeder	9
Snack-gulerødder.....	9
Plukærter	9
Sukkermajs.....	9
Arrangementer	10

Aktuelt

Grundet ferie hos redaktøren kommer det næste GrønsagsNYT først i uge 34, så vi har forsøgt at skue lidt fremad i tiden med, hvad der kan forventes at dukke op af udfordringer i marken! Skulle der opstå pludselige nyheder af stor relevans, vil der blive udsendt et ekstra GrønsagsNYT.

Pga. den korte, men intense varmeperiode for et par uger siden, ser vi nu en del skadelige insekter i større tal – f.eks. bladlus, kålmøl og kålbladhveps. De naturlige fjender er dog godt med og gør pæne indhug i bl.a. bladlusene.

Pt. er vi midt i en periode med køligt, fugtigt og blæsende vejr, nærmest lidt efterårsagtigt. Det betyder mindre intens vanding og ganske fornuftige vækstvilkår for de fleste kulturer. Det fremmer dog også udviklingen af bladsvampe, f.eks. løgskimmel, kålskimmel og alternaria.

Efterafgrøder og grøngødning

Det er tid til at tænke efterafgrøder, både pligtige, MFO, målrettede og husdyrefterafgrøder. Vedlagt oversigt over frister og typerne.

Gratis nyhedsbrev om kompost – fakta og erfaringer

Viden og erfaringer om brug og produktion af kompost – især rettet mod gartnerisektoren – samles i et samarbejde mellem vidensinstitutioner, rådgivnings- og komposteringsvirksomheder samt myndigheder i fem lande (Storbritannien, Belgien, Nederlandene, Tyskland og Danmark). Projektet hedder SOILCOM og ledes af Aarhus Universitet.

HortiAdvice er del af dette samarbejde og udgiver et dansk nyhedsbrev med highlights herfra. Nyhedsbrevet er gratis og vil udkomme i 2020-2022. Ønsker du at modtage nyhedsbrevet, så send venligst mail til juch@hortiadvic.dk eller rdv@hortidvice.dk med en bekræftelse.



Nyt om kemi

Dispensation til Vertimec i porrer

Der er givet dispensation til brug af Vertimec mod trips i porrer. Vedhæftet tillægsetikette med brugsanvisning som skal anvendes som tillæg til etiketten på emballagen/dunken.

Det anbefales at printe tillægsetiketten ud og have den liggende sammen med emballagen/dunken på kemilageret.

Dispensationen vil ligeledes kunne findes på Middeldatabasen fra først i næste uge.

Nedvisning af kartofler til lagring

Da en del af nyhedsbrevets læsere også dyrker kartofler til lagring, nævner vi lige, at der er kommet dispensation til brug af hhv. Reglone og Gosai til nedvisning.

Der kan findes de nødvendige oplysninger om tro og love erklæring, supplerende sprøjtejournal, krav til afdrift osv. i Middeldatabasen under Dispensationer.

Nyt om tilskudsordninger

GUDP II 2020

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) har åbnet ansøgningsrunde 2 i 2020 for hele fødevaresektoren. Denne gang er puljen på ca. 80 mio. kr. med ansøgningsfrist den 9. september 2020 kl. 12:00. Se mere på www.gudp.dk.

GUDP er udviklingsprojekter evt. kombineret med forskning og demonstration. Der kan også søges til Netværksprojekter.

Nyt om kulturerne

Pesticider i GrønsagsNYT

Vedr. sprøjtefrister, antal behandlinger, afstandskrav og restriktioner vedr. antal behandlede hektarer, for de nævnte midler i GrønsagsNYT henvises via midlernes hyperlink til Middeldatabasen.

Det er brugerens ansvar, at alle regler omkring anvendelse bliver overholdt. Følg derfor linkene på de enkelte midler til middeldatabasen.

Salat

Salatbladlus

Vi er nu begyndt at se egentlig indflyvning til salatmarkerne af salatbladlus (*Nasonovia ribisnigri*) fra vinterværterne. Der vil derfor være risiko for opformering af salatbladlus, især i varmt og fugtigt vejr.

Normalt er NAS-resistente sorter sikret mod angreb, men der findes en race af salatbladlus, der kan modstå denne resistens.

Salatbladlusen er den mest besværlige bladlus i salat, da den søger indad i salathovederne og oftest kun kan afsløres ved gennemskæring af et antal hoveder.

De mest anvendte bladlusmidler er:

[Movento SC 100](#), 0,45 l pr. ha og [Mospilan SG](#), 0,25 kg pr. ha, begge max 2 behandlinger og 7 dages sprøjtefrist.

[Pirimor 500 WG](#), 0,3 kg pr. ha, 1 behandling og 7 dages sprøjtefrist. Midlet kræver lunt og stille vejr for at have tilstrækkelig dampvirkning

I økologi er [Spruzit Neu](#) kun godkendt mod sommerfuglelarver og andre arter bladlus end salatbladlus, så man kan kun håbe på en sideeffekt ved regelret brug.

Selvom de 3 nævnte insekticider til konventionelt brug, af producenterne hævdes at være relativt skånsomme over for nyttedyr, så evaluer altid forekomsten af både nyttedyr og bladlus, inden der sættes en behandling i gang. Nyttedyr er i denne sammenhæng svirrefluer, guldøjer, rovtæger (*Orius* sp. m.fl.) og flere arter af mariehøns.

Salatskimmel

Der er nu igen risiko for udvikling af *Bremia* salatskimmel, primært i ikke fuldt resistente sorter. Dels er det en fugtig periode, dels er nætterne langsomt ved at blive så lange, at der er tilstrækkeligt med dug til at igangsætte angreb, selv i en tør periode.

Forebyg nu generelt med fx [Aliette 80 WG](#) og [Proplant](#). Hvis der er opstået salatskimmel i produktionen, bør der slås over på mere specifikke salatskimmelmidler som [Revus](#) og [Cabrio Duo](#).

Kål

Den hårede engtæge

Risikoen for angreb af den hårede engtæge i nyplantet kål er endnu ikke overstået. Man regner med, at angrebsrisikoen bliver væsentligt formindsket, fra planterne har stået 14 dage eller mere i marken. Angreb af denne skadevolder giver hvert år et større eller mindre antal blinde planter i de sent plantede kål – i visse tilfælde mere end halvdelen af plantebestanden. Hold godt øje især i markkanter langs levende hegn.

Krusesygegalmyg

Krusesygegalmyggen kan især i varme somre udgøre en trussel i blomkål og broccoli, idet larverne kan skamfere hovedet i større eller mindre grad. Skaden kan let forveksles med skaden af engtægen. Der har ikke været meldt angreb af betydning de sidste år, men den kan lokalt optræde i større antal. Det er vanskeligt at time bekæmpelsen, men [Karate 2,5 WG/Lamdex](#) er i hvert fald godkendt til brug mod denne skadevolder i hoved-, blomster- og rosenkål. Der må også forventes en vis sideeffekt ved brug af andre midler mod andre skadegørere.

Kålmøl

Vi ser nu igen en del flyvende kålmøl i markerne og der meldes nu også om små larver flere steder. Det er formentlig anden generation af kålmøl, der nu er aktive, idet vejret ikke har været til invasion syd- eller østfra. Det er kun muligt at bekæmpe kålmøllene i deres larvestadier, så det gælder om at time bekæmpelsen til tidspunkter, hvor der er mange larver.

Der er stadig en stor dødelighed af æg og larver som følge af det ustadiige sommervejr.

Ved fund af flere larver kan det igen blive nødvendigt at udføre bekæmpelse.

Erfaringerne fra tidligere år er, at de bekæmpes bedst med [Steward 30 WG](#) mod de helt små larver. Ved store forekomster af larver kan Steward 30 WG blandes med [Movento 100 SC](#).

I økologi er der god effekt af B.t. midlerne, Turex og Dipel DF, men især på larver i de første udviklingsstadier. B.t. midlerne bruges også mere og mere i konventionel produktion og de ser ud til også at virke ganske godt her!

Kålbladhveps

Nogle få timers solskin og stille vejr er tilsyneladende nok til at få bladhvepsene på vingerne, da den er set sværme i flere kålmarker på det sidste. Den har tilsyneladende størst præference for kinakål, pak choi, bladsennep og rucola og ses ikke som et problem i de mere voksbeklædte kåltyper. Larverne, der først er mat grålige, senere sorte og fløjlsagtige, er lette at bekæmpe med et pyrethroid eller [Spruzit Neu, mindre anvendelse](#) – i de kulturer, hvor disse midler er godkendt. Vær opmærksom på, at larverne kan drysse fra korsblomstret ukrudt ned i selve kulturen, hvilket kan føre til kassation af salgsvaren.

Den lille kålflue

Jf. temperatursummodellen (se nedenstående link) på LandbrugsInfo forventes der stadig omkring 2-3 ugers flyvning og æglægning af den lille kålflues anden generation.

https://www.landbrugsinfo.dk/public/4/2/6/plantebeskyttelse_kalfluer_kalfluerag_varsling

Hvis småplanterne ikke er behandlet med Tracer/Conserve eller Verimark, må det anbefales at dække de udplantede hold med insektnet i ca. 3 uger fra begyndende æglægning. De hvide æg kan ret let findes ved rodhalsen af planter der ikke er dækket.

Kålsommerfugle og kålugler

Der ses nu lokalt flyvning af de hvide kålsommerfugle. Om det både er den lille og store kålsommerfugl vides ikke. Kålugler vil også være et problem i nogle marker fremadrettet. Bekæmpelsen er som med kålmøllene rettet mod de små larver; dvs. f.eks. [Steward 30 WG](#) i konventionelle kål og B.t. midler i økologiske.

Trips

Fra slutningen af juli og fremad vil der kunne forventes indflyvning af trips (flere arter) til kålene, hvor især hovedkålene er følsomme for raspen af disse dyr i overfladen. Flyvningen sker især på lumre, tordenvarme dage ("tordenfluer"), så det er vigtigt at være på forkant med evt. bekæmpelse ved optræk til denne vejrtype.

Følgende midler er godkendt til brug mod trips i kål (ikke alle typer kål – se etiket):

0,2 kg pr. ha [Karate 2,5 WG/Lamdex](#), max 3 behandlinger i broccoli, blomkål, rosenkål, savoy-, rød- og hvidkål. Behandlingsfrist 3 dage. Max 3 behandlinger.

0,225 l pr. ha [Fastac 50](#) i hovedkål, broccoli og blomkål. Behandlingsfrist 7 dage. Max 2 behandlinger

I økologi er Spruzit Neu godkendt som [minor use](#) i blad-, hoved- og blomsterkål mod både trips. Dosering 6 l pr. ha, max 2 behandlinger og 3 dages sprøjtefrist.

Bladsvampe

Kålskimmel kan findes i mange kålmarker i år. Det skyldes formentlig det kølige, fugtige og blæsende vejr, som denne skadevolder foretrækker. I de fleste tilfælde dør svampen ud i fbm. med periodisk sommervejr, men det kan af og til udvikle sig til alvorlige angreb, der kan påvirke planternes trivsel efterfølgende. Dette gælder især, hvis angrebet er blevet systemisk i planten. I disse tilfælde vil der komme decideret væksthæmning senere hen og krøllede, deforme blade. I blomsterkålen kan der også forekomme revnedannelser og råd indvendigt i hovederne.

[Dithane NT](#) er regelret godkendt i blomkål og broccoli (2,0 kg pr. ha, max. 4 behandlinger og 30 dages sprøjtefrist).

Der findes en godkendelse til [mindre anvendelse for Revus i broccoli](#) mod kålskimmel med 0,6 l pr. ha, max. 2 behandlinger og 14 dages sprøjtefrist.

Alternaria og gråskimmel begynder at kunne få fodfæste i tætte kulturer af kål og kinakål. Udover de 3 midler med strobiluriner (Amistar (gl etiket), [Signum WG](#) (ikke bladkål) og [Ortiva Top](#)) er Switch 62,5 WG også godkendt med en [mindre anvendelse](#) i alle typer kål mod gråskimmel og storknoldet knoldbægersvamp. Det kan bruges som resistensbryder ind imellem behandlinger med strobilurinerne.

Løg

Svampebekæmpelse i konventionelle løg

Hvis der ikke er angreb i egen løgmark, kan anvendes 2,0 kg [Dithane NT](#) + 0,2-0,3 l [Shirlan Ultra](#) pr. ha

Ved angreb skal anvendes 2,5 [Cabrio Duo](#) + 0,5 Shirlan Ultra og ved kraftige angreb skal der yderligere tilsættes 1,6 Dithane NT.

Som forslag til forebyggende behandling, kan behandles efter følgende plan i de gule:

Til forebyggende behandlinger bruges der 2,5 kg Dithane NT + 0,4 l Shirlan pr. ha.

- 5-6 uger før forventet frilægning; 2,5 kg Dithane NT + 0,4 Shirlan
- 4-5 uger før forventet frilægning; 2,5 l Cabrio Duo + 0,4 l Shirlan + 1,6 Dithane NT
- 4 uger før forventet frilægning; 2,5 l Cabrio Duo + 0,4 l Shirlan + 1,6 Dithane NT
- 3 uger før forventet frilægning; 2,5 l Cabrio Duo + 0,4 l Shirlan + 1,6 Dithane NT
- 2 uger før forventet frilægning; 1 kg Signum WG + 0,3 l Shirlan
- 1 uge før forventet frilægning; 1 kg Signum WG + 0,3 l Shirlan

I **røde løg** kan mængden af Shirlan med fordel øges med 0,1 l i fht. de gule løg.

Ved varmt og fugtigt vejr kan der i **røde løg** lægges en ekstra sprøjtning ind med: 1,0 kg Switch 62,5 WG + 0,5 l Shirlan

Husk, at ved angreb eller varslings angreb skal der behandles meget mere intensivt hver 3-4. dag.

Sammen med svampesprøjtningerne skiftes der mellem at iblande enten 3 kg bittersalt (2 % magnesiumsulfat opløsning), 1,5 kg mangansulfat eller 1,5 kg zinksulfat pr. ha. Der må ikke sprøjtes i solskinsvejr pga. risiko for svidning. Der kan også bruges et bredspektret mikronæringsmiddel som medtages med 1-1,5 l, hver gang der svampesprøjtes.

Til de sidste behandlinger kan bruges 4-5 kg urea.

Virkning og dækning forbedres ved tilsætning af spredeklæbemiddel. Ved tilsætning af mikronæring kan det evt. undlades.

Hvis der er trips, kan der medtages 0,2 kg Karate eller 0,75 l Movento.

Alle doseringer er pr. ha.

Økologiske løg **Gråskimmel**

Der kan forebygges mod gråskimmel i planteløgene med [Serenade ASO](#).

Der skal behandles med 5,0 l + 0,15 l Aminosol pr. ha 5 gange med 10 dages mellemrum fra løgene har 8 blade. Vi afprøver det igen i år for at vurdere, om effekten er tilstrækkelig. Afprøv det i røde løg, hvor der er størst risiko.

Porrer **Rust**

Der begynder så småt at vise sig rust i porrerne. Porrerust kan bekæmpes med Orius Max 200 EW (347-39), hvor der findes en [godkendelse til mindre anvendelse](#). Dette gælder for reg.nr. 347-39, hvorimod Orius 200 EW (396-24) ikke længere må anvendes eller besiddes fra og med d. 12/8-20.

Trips, Vertimec godkendt på dispensation

Vær opmærksom på trips i porrerne; de kan komme i store mængder lige pludseligt. Trips kan normalt forebygges med hyppige vandinger (eller nedbør), men i varme og tørre somre er det næsten umuligt.

I de konventionelle porrer er det muligt at bekæmpe trips med [Karate 2,5 WG/Lamdex](#), som er godkendt med 0,2 kg pr. ha og max 2 behandlinger pr. år. Og så er dispensationen på Vertimec EC netop kommet. Når Karate/Lamdex-behandlingerne er brugt op, må der anvendes 0,5 l pr. ha, højst tre behandlinger. Godkendelsen gælder indtil 28. oktober. Læs mere om dispensationen øverst i nyhedsbrevet under Nyt om kemi!

Gulerødder

Tæt top giver udfordring med bladsvampe

Vækstsæsonen 2020 har for gulerødder ind til videre være noget nær optimal. Ikke for vådt med gode forhold til ukrudtsbekæmpelse både i øko og konventionel. Ikke for tørt og med gode fremspiringsbetingelser og vækstbetingelser. Lidt koldt i starten, men ikke for koldt i april-maj og ikke for varmt. De gode vækstbetingelser gør, at gulerødderne i år udnytter kvælstof bedre end normalt og står med meget kraftig tæt top allerede i juli måned. Det giver også optimale betingelser for udvikling af **knoldbægersvamp**, når toppen nær jordoverfladen begynder at rådne. Knoldbægersvamp er vanskelig at kontrollere med svampemidler. Forsøg med fluorescerende sporstof i gulerødder har vist, at det er næsten umuligt at sprøjte i bund i den tætte gulerodstop. Alternativt kan knoldbægersvamp kontrolleres ved at skabe lys og luft mellem rækkerne, f.eks. med en toptrimmer eller endnu bedre: en kombination af toptrimmer og svampesprøjtning.

Bladplet og meldug kan også være en plage i gulerødder, men så længe det er køligt, trives de dårligt og giver normalt kun udfordringer i marker med anstrengt sædskifte.

Foruden de svampemidler, som er nævnt i tabellen under pastinakker, er Contans og Serenade ASO også godkendt til svampebekæmpelse i økologiske gulerødder. Contans er måske det mest virksomme mod knoldbægersvamp. Udfordringen med Contans er, at produktet er en levende svamp (*Coniothyrium minitans*) som efter udsprøjtning skal opformeres på knoldbægersvamp. Contans mister formentlig effekt i sollys og tørt vejr uden levende knoldbægersvamp på bladene. Der skal altså være noget for Contans at spise. Men man må heller ikke vente så længe, at det bliver for koldt til, at rovsvampen kan arbejde effektivt.

Persillerod, pastinak

Bladplet og andre svampesygdomme

Pastinakkerne har nu nået en størrelse, hvor de lukker helt sammen i rækkerne. Det er nu tid til at holde øje med angreb af bladplet. Ud over, at bladplet kan forårsage direkte udbyttetab, mener videnskaben også, at nogle former for bladplet kan smitte rødderne med sort Canker.

Produkter mod svampesygdomme i pastinak

Produkt	Sygdomme	Max dose-ring	Antal ¹⁾	Sprøjtefrist
Amistar	Bladplet	0,8 l/ha	max 1 beh	14 dage
Armcarb 85 SP ²⁾	Meldug	3 kg/ha	max 8 beh	1 dag
Dithane NT	Bladplet	2 kg/ha	Max 4 beh	30 dage
Ortiva Top	Bladplet, knoldbægersvamp, meldug	1 l/ha	max 1 beh	14 dage
Signum WG ³⁾	Bladplet, cercospora, meldug	1 l/ha	max 2 beh	14 dage
Switch 62,5 WG	Rodfiltsvamp, knoldbægersvamp	0,8 kg/ha	max 2 beh	7 dage

¹⁾: max 2 behandlinger med strobilurin-holdige produkter.

²⁾: godkendt til anvendelse i både konv. og økologi.

³⁾: risiko for rester af boscalid i rodfrugter

Ukrudt

Planter af persillerod er stadig relativt små og giver ikke meget konkurrence over for ukrudt. Hold dem rene med renser så længe som muligt og hold øje med nyfremspiret ukrudt. Bl.a. kortstråle kan udvikle sig til en plage i løbet af sommeren.

Rødbeder

Bladplet

Vi ser i stigende omgang flere forskellige typer bladplet i rødbeder. Angreb opstår ofte i store pletter, hvor bladene visner helt ned. Der findes umiddelbart ingen godkendte midler til bekæmpelse af bladplet i rødbeder. Efter, at Amistar er revurderet, står rødbeder ikke længere på den nye etikette. Armicarb 85 SP er minor-use-godkendt mod meldug og virker formentlig ikke mod bladplet. Switch 62,5 WG er minor-use-godkendt mod rodfiltsvamp og knold-bægersvamp. Sideeffekt mod ramularia-bladplet er ukendt og med en dosering på 0,8 kg pr. ha og max 2 behandlinger bliver prisen relativt høj for Switch (sprøjtefrist 7 dage).

Vanding

Rødbeder skal vandes intensivt både for at undgå skurvede rødder, men også fordi rødbeder har vanskeligt ved at starte op igen, hvis først de får lov til at tørre ud, så de sover. Når de vandes intensivt, skal man være særlig opmærksom på, at rødbederne ikke løber tør for kvælstof. Hvis rødderne tager skade af tørke, har de vanskeligere ved at holde trit med kvælstofoptagelsen.

Snack-gulerødder

De sidste snack-gulerødder til halmdækning blev sået i sidste uge, så der er gulerødder på alle stadier i marken – fra under fremspiring til høstklar. Hold godt øje med manganmangel i de små planter med 1-3 løvblade. Manganmangel opstår ofte efter intensiv jordbehandling - også selvom der er varme i jorden.

Plukærter

Sæsonen lakker mod enden for dem, der dyrker ærter som supplement til jordbær og nye kartofler, men for dem der plukker ærter et stykke tid endnu, kan det være vigtigt at holde øje med bladlus, som begynder at være tilstede i andre afgrøder samt at forebygge sygdomme som f.eks. gråskimmel

Sygdomme

- [Gråskimmel](#) angriber især bælgene i varmt og fugtigt vejr og angreb starter ofte i blomsten, når den ikke rigtig falder af.
- [Ærtesyge](#) kan forårsages af tre forskellige svampe. Svampen spredes med vandplask og kan komme via frøsmitte, jorden eller planterester. Sygdommen fremmes af varme og fugtige forhold.

Af aktive handlinger kan mancozebmidler som [Dithane NT](#), [Mastana 500](#) m. fl have effekt mod ærtesyge og ærteskimmel, mens f.eks. [Signum WG](#) (ærte- og gråskimmel: 14 dages sprøjtefrist) og [Switch 62,5 WG](#) (ærtesyge, gråskimmel: 14 dages sprøjtefrist) er de mest effektive mod gråskimmel.

Suktermajs

Bladlus, m.m.

De midler der er godkendt/på mindre anvendelse i suktermajs er:

[Pirimor 500 WG/LFS Pirimicarb](#): Mod bladlus. 280 g pr. ha. Behandling ved begyndende angreb. Tidligst ved BBCH 51 og senest 7 dage før høst. Max 1 gang pr. sæson. Effekten er optimal ved minimum 15°C og gerne stigende temperaturer efter sprøjtning og stille vejr.

[Movento SC 100](#): Mod bladlus. 0,75 l pr. ha. Max 2 behandlinger med mindst 14 dages mellemrum. BBCH 51-69, dog senest 7 dage før høst. Midlet er systemisk, så pas på ikke at overdrive væskemængden, så der løber for meget af.

[Steward 30 WG](#): Mod majshalvmøllets larve. 125 g pr. ha. 7 dages sprøjtefrist. Kontaktmiddel og en god sprøjteteknik som sikrer, at man træffer det ønskede sted, er vigtig. Optimal effekt ved lune forhold og 2 timers tørvejr.

Arrangementer

26. august Åbent Hus i ClimateVeg og DoubleCrop/ComCrop forsøgene på Årslev. Nærmere info senere!

8. september 2020 **Book en mark** – Økologisk frugt og grønt med afsender

Krenkerup Gods, Krenkerupvej 33, 4990 Sakskøbing

Her er det muligt som økologisk frugt- og grøntproducent at mødes med repræsentanter fra storkøkkener og andre aktører fra foodservice m.fl., som er interesseret i at få fingrene i/aftage frugt og grønt fra lokale økologiske producenter.

Tilmeldingsfrist 1. september. Nærmere information fås ved og tilmelding skal ske til Nanna Holst Petersen, Landbrug & Fødevarer, på nhpe@lf.dk.

Ferie

	Ferieuger
Emma Skov	31 og 32
Karina Frandsen	31 og 32
Ole Scharff	31, 32 og 33
Peder Krosgård	34
Richard de Visser	31 og 32

**Ole Scharff**

Tlf: 87 40 66 34 /
Mobil: 40 73 19 58
ohs@hortiadvise.dk

**Lars Møller**

Tlf: 40 84 30 11
lrm@hortiadvise.dk

**Karina Frandsen**

Tlf: 87 40 66 12 /
Mobil: 21 64 80 85
kfr@hortiadvise.dk

**Emma Christiani Skov**

Tlf: 87 40 66 01 /
Mobil: 30 66 61 78
esko@hortiadvise.dk

**Dan H. Christensen**

Tlf: 87 40 66 07 /
Mobil: 21 65 50 51
dach@hortiadvise.dk

**Pernille Kynde**

På barsel

**Richard de Visser**

Tlf: 87 40 66 10 /
Mobil: 30 53 87 16
rdv@hortiadvise.dk

**Peder Krogsgård**

Tlf: 40 37 46 51
pkl@hortiadvise.dk

**Paw Helms**

Tlf: 87 40 66 03 /
Mobil: 20 25 64 94
pahe@hortiadvise.dk

HortiAdvice tager forbehold for tastefejl og lignende. Nyhedsbrevet må ikke videresendes. HortiAdvice har copyright på billederne