

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Spruzit Neu (364-67) mod insekter i økologisk produktion af hovedkål, bladkål, blomsterkål, porre og løg, samt økologisk produktion af rød- og hvidkløver til frø og hestebønner til foder på friland

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. GartneriRådgivningen kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til Mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for Spruzit Neu (634-67) mod insekter i økologisk produktion af hovedkål, bladkål, blomsterkål, porre og løg, samt økologisk produktion af rød- og hvidkløver til frø og hestebønner til foder på friland

Insektmiddel:

- Må kun anvendes mod insekter i økologisk produktion af hovedkål, bladkål, blomsterkål, porre, løg, rød og hvidkløver til frøproduktion samt hestebønner til foder på friland
- Må ikke anvendes senere end 3 dage før høst.
- Brugsanvisningens angivelse af dosering, antal behandlinger, interval, sprøjtetidspunkt og sprøjtefrist skal overholdes
- Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand
- Farligt for bier – for at beskytte bier og andre bestøvende insekter må dette produkt ikke anvendes i blomstrende afgrøder.

Advarsel:

”Se Spruzit Neu etiketten”

Brugsanvisning

Til anvendelse på friland

Afgrøde	Skadevolder	Max dosering pr. behandling	Antal behandlinger (interval)	Behandlings-tidspunkt (vækststadier)	Sprøjtefrist/ PHI
Hovedkål, bladkål og blomsterkål	Sugende og gnavende insekter bl.a. sommerfuglelarver, kålbladlus, trips og glimmerbøsser	6 L/ha	2 (7 dage)	Ved behov	3 dage
Porre	Trips	6 L/ha	2 (7 dage)	Ved behov	3 dage
Løg	Trips og bladlus	6 L/ha	2 (7 dage)	Ved behov	3 dage
Rød- og hvidkløver til frøproduktion	Kløversnudebille	10 L/ha	2 (7 dage)	Ved behov	Ikke relevant
Hestebønner til foder	Bedebladlus	Afgrødehøjde: < 50 cm: 6 L/ha Afgrødehøjde: > 50 cm: 9 L/ha	2 (7 dage)	Ved behov	3 dage

Sprøjteteknik/udstyr: Sprøjt aldrig i direkte sollys eller ved temperaturer under 5° C eller over 20° C.

Spruzit Neu er et kontaktmiddel. Effektiv virkning kræver optimal fordeling af sprøjtevæsken i afgrøden. Alle plantedele skal dækkes grundigt uden afdrypning. Vælg dyser der minimerer afdrift.

Risiko for skade: Udfør altid en tålsomhedsafprøvning første gang midlet anvendes i nye kulturer eller under nye vækstforhold.

Dato: 1. august 2018 opdateret 5. marts 2024