

# Brugsanvisning til mindre anvendelse af Spruzit Neu (364-67) mod skadedyr i baby leaf og persille på friland

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

## **Ansvar for mindre anvendelse og vejledning**

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

### *Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar*

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. GartneriRådgivningen kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til Mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

## Vejledning for Spruzit Neu (364-67) mod bladlus, sommerfuglelarver, jordlopper, trips og minerende larver af bl.a. bedefluen i baby leaf samt jordlopper og minerende larver i persille på friland

### Insektmiddel:

- Må kun anvendes mod bladlus, sommerfuglelarver, jordlopper, trips og minerende larver af bl.a. bedefluen i baby leaf samt jordlopper og minerende larver i persille på friland.
- Må i baby leaf ikke anvendes senere end 3 dage før høst.
- Må i persille ikke anvendes senere end 7 dage før høst.
- Brugsanvisningens angivelse af dosering, antal behandlinger, interval, sprøjtetidspunkt og sprøjtefrist skal overholdes
- Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand
- Farligt for bier – for at beskytte bier og andre bestøvende insekter må dette produkt ikke anvendes i blomstrende afgrøder.

### Advarsel:

”Se Spruzit Neu etiketten”

## Brugsanvisning

Til anvendelse på friland

### Afgrøde, skadevolder, dosering, antal behandlinger, interval, behandlingstidspunkt og sprøjtefrist

Afgrøde	Skadevolder	Dosering pr. behandling	Antal behandlinger (interval)	Behandlings-tidspunkt	Sprøjtefrist/ PHI
Baby leaf	Bladlus, sommerfuglelarver, jordlopper, trips og minerende larver af bl.a. bedefluen	6 liter/ha	Max. 2 (5-7 dage)	Ved behov på 1 – 8 bladstadiet	3 dage
Persille	Minerende larver og jordlopper	6 liter/ha	Max. 2 (5-7 dage)	Ved behov	7 dage

### Sprøjteteknik/udstyr:

Sprøjt aldrig i direkte sollys og ved temperaturer under 5 grader eller over 20 grader.

Da Spruzit Neu er et kontaktmiddel må der forventes en reduceret og mere svingende effekt mod minerende larver.

Dato: 29. maj 2018