

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Spruzit Neu (364-67) mod bladlus, mellus, trips, spinde mider, uldlus, skjoldlus, bladbiller og sommerfuglelarver i prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til mindre anvendelse følges. HortiAdvice kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for Spruzit Neu (364-67) mod bladlus, mellus, trips, spindemider, uldlus, skjoldlus, bladbiller og sommerfuglelarver i prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse

Insektmiddel:

- Må kun anvendes til bekæmpelse af bladlus, mellus, trips, spindemider, uldlus, skjoldlus, bladbiller og sommerfuglelarver i prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse
- Brugsanvisningens angivelser skal overholdes
- Hvis midlet anvendes på frugtbærende frugttræer eller frugtbuske, skal frugter fjernes før salg
- Ved håndtering af behandlede prydplanter og planteskolekulturer skal der anvendes kemisk bestandige handsker
- Ved anvendelse i planter dyrket i potter på jorden uden recirkulering: Potterne skal stå helt tæt (pottetæt kultur) eller kulturen skal dække arealet fuldstændigt (dækkende kultur).
- Udflytning må tidligst foretages 1 dag efter sprøjtning, for at beskytte bier
- **For at beskytte bier, må planter behandlet under blomstring først udflyttes efter afblomstring**

Advarsel:

”Læs Spruzit Neu etiketten”.

Brugsanvisning

Anvendelse: Til bekæmpelse af bladlus, mellus, trips, spindemider, uldlus, skjoldlus, bladbiller og sommerfuglelarver i åbne væksthuse.

Afgrøde	Max dosering pr. behandling	Vandmængde (L/ha)	Antal behandlinger pr. hold (interval)	Antal hold pr. areal pr. år	Karensperiode for hvornår der må forekomme udflytning til containerplads med eller uden recirkulering
Prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter på <u>tætte borde</u> med recirkulation <i>eller</i> på <u>tæt bund</u> med opsamling/recirkulation.	Afgrødehøjde < 50 cm: 6 L/ha	800-1200	Max 8 (min. 5 dage)	Max 4 hold. Alternativt max 32 behandlinger pr. areal pr. år	1 dag. Planter behandlet under blomstring må først udflyttes efter afblomstring.
	Afgrødehøjde 50-125 cm: 9 L/ha	1200-1800			
	Afgrødehøjde >125 cm: 12 L/ha	1800-2400			
Prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter <u>på jorden</u> . Potterne skal stå så tæt som muligt.	Afgrødehøjde < 50 cm: 6 L/ha	800-1200	Max 8 (min. 5 dage)	Max 4 hold. Alternativt max 32 behandlinger pr. areal pr. år	1 dag. Planter behandlet under blomstring må først udflyttes efter afblomstring.
	Afgrødehøjde 50-125 cm: 9 L/ha	1200-1800			
	Afgrødehøjde >125 cm: 12 L/ha	1800-2400		Alternativt max 16 behandlinger pr. areal pr. år	

Sprøjteteknik:

Sprøjter med horisontal sprøjtebom samt sprøjter med lanse.

Behandlingstidspunkt:

Ved behov – læs også etikettens anbefalinger.

Risiko for skade:

Ved anvendelse i nye kulturer og sorter, bør midlet afprøves på et mindre antal planter først for at få erfaring med midlet samt reducere risikoen for skader.

Økologi:

Spruzit Neu må anvendes i økologisk produktion.

Dato: 24. januar 2022

Opdateret 7. februar 2022