

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Switch 62,5 WG (1-201) mod svampesygdomme i

gulerod, persillerod, pastinak, knoldselleri, rødbede, skorzonerrød, peberrod, kepaløg, skalotteløg, hvidløg, hovedsalat og andre salatplanter, brassica-arter, salatplanter og brassica-arter til baby-leaf, krydderurter, asparges samt til bønner og lupiner til modenhed

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i
plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. GartneriRådgivningen kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til Mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for Switch 62,5 WG (1-201) mod svampesygdomme

i gulerod, persillerod, pastinak, knoldselleri, rødbede, skorzonerrød, peberrod, kepaløg, skalotteløg, hvidløg, hovedsalat og andre salatplanter, brassica-arter, salatplanter og brassica-arter til baby-leaf, krydderurter, asparges samt til bønner og lupiner til modenhed

Svampemiddel:

- Max 2 behandlinger pr. sæson.
- Må ikke anvendes senere end de sprøjtefrister for de forskellige afgrøder som er angivet i nedenstående tabel.
- Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand

Advarsel:

"Læs Switch 62,5 WG etiketten".

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Switch 62,5 WG mod svampesygdomme

i gulerod, persillerod, pastinak, knoldselleri, rødbede, skorzonerrød, peberrod, kepaløg, skalotteløg, hvidløg, hovedsalat og andre salatplanter, brassica-arter, salatplanter og brassica-arter til baby-leaf, krydderurter, asparges samt til bønner og lupiner til modenhed

Dosering, skadegører, antal behandlinger, sprøjetidspunkt og sprøjtefrist

Afgrøder	Skadevolder	Dosering	Max antal behandlinger	Sprøjetidspunkt	Sprøjtefrist (PHI)
Gulerod, persillerod, pastinak, rødbede, skorzonerrød, peberrod	<i>Rhizoctonia solani</i> (rodtiltsvamp) Storknoldet knoldbægersvamp	0,8 kg/ha	2	Fra 4 blivende blade (BBCH 14)	7 dage
Kepaløg	Gråskimmel	1,0 kg/ha	2	Fra færdig bladudviklingen (BBCH 20)	14 dage
Skalotteløg, hvidløg	Gråskimmel Løgbladgråskimmel (<i>Botrytis squamosa</i>).	1,0 kg/ha	2	Fra færdig bladudviklingen (BBCH 20)	14 dage
Knoldselleri	Rodtiltsvamp Storknoldet knoldbægersvamp	1,0 kg/ha	2	Fra 4 blivende blade (BBCH 14)	14 dage
Hovedsalat og andre salatplanter, inklusiv til babyleaf	Gråskimmel	0,6 kg/ha	2	Fra 1 blivende blad (BBCH 11)	7 dage
Hovedkål, blomsterkål og bladkål, brassica-arter til babyleaf og krydderurter	Gråskimmel Storknoldet knoldbægersvamp	0,6 kg/ha	2	Fra 1 blivende blad (BBCH 11)	7 dage
Asparges	Gråskimmel Løgringplet <i>Stemphylium vesicarium</i>	1,0 kg/ha	2	Efter høst (fra BBCH 61)	6 mndr
Bønner og lupiner til modenhed	Antracnose Gråskimmel Storknoldet knoldbægersvamp	1,0 kg/ha	2	Fra begyndende blomstring (BBCH 61)	28 dage